

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 24.06.2016 / 10701

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Elma	Avrupa kırmızıörümceği (<i>Panonychus ulmi</i>)	37,5 g/100 L su	7 gün
	Akdiken akarı (<i>Tetranychus viennensis</i>)	30 g/100 L su	
Armut	Armut psillidi (<i>Cacopsylla pyri</i>)	100 g/100 L su	7 gün
Fasulye	Pamuk kırmızıörümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	75 g/100 L su	7 gün
Bağ *	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 g/100 L su	7 gün
Çilek	Pamuk kırmızıörümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	60 g/100 L su	7 gün
Pamuk	Kırmızıörümcekler (<i>Tetranychus spp.</i>)	60 g/da	7 gün
Domates	Kırmızıörümcekler (<i>Tetranychus spp.</i>)	75 g/da	3 gün
Gül	Pamuk kırmızıörümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	60 g/100 L su	7 gün
Karanfil	Kırmızıörümcekler (<i>Tetranychus spp.</i>)	60 g/100 L su	7 gün
Hıyar (sera)	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	40 g/100 L su	7 gün
Kornişon (sera)			

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elmada Avrupa kırmızıörümceği ve akdiken akarına karşı mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Armutta armut psillidine karşı kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp, 2. ve 3. dönem nimfler görülmeye başladığı ve sürgünlerin %15'ten fazlasında bulaşma görüldüğünde uygulama yapılır. Her sürgünde bir kırmızıörümcek görüldüğü zaman o sürgün bulaşık kabul edilir.

Fasulye, Domates, Hıyar ve Kornişonda kırmızıörümcekler karşı fasulyede sayımı yapılan 20 yaprakta ortalama yaprak başına 3 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde; domates hıyar ve kornişonda ise sayımı yapılan 10 yaprakta ortalama yaprak başına 5 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılır.

Bağda iki noktalı kırmızıörümceğe karşı yaprak başına 5-8 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.



**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.**

KARIA 20 WP

İslenabilir Toz (WP)

Grubu	21A	İnsektisit + Akarisit (Böcek ve Kırmızıörümcek İlacı)
-------	-----	--

%20 Tebufenpyrad

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA
KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir. Ciltte hafif kaşıntı yapabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.

Göz ile teması halinde: Temiz su ile 15 dakika süreyle yıkanmalı eğer tahriş sürüyor ise doktora başvurulmalıdır.

Deri ile teması halinde: Sabun ve su ile yıkanmalıdır.

Solunması halinde: Hasta temiz havaya çıkarılmalıdır.

Yutulması halinde: 1-2 bardak su içirilerek hastanın kusması sağlanmalı ve doktora başvurulmalıdır.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

10 Ocak 2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
RABUL EDİLMİŞTİR.



Murat BAYSAL
Yurtiçi Satış Müdürü

Net Miktarı:
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Tebufenpyrad, Kaolen, Alkil ester sülfat



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H334: Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir.

H372: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyni solumayın.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız.
- Bitki koruma ürününü kendi ambalajlarında kapalı olarak, kuru ve serin yerde saklayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlarla uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.**

Üretim Tesisi: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA
Merkez: Toplarönü Sok. No: 16 Anadoluhisarı / İSTANBUL
Tel: (0216) 308 65 87 - 90 Fax: (0216) 308 65 84

**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER
ve ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Toplarönü Sk. No:16 34810 Anadoluhisarı Beşiktaş/İST. Telefon: YD: 3020916508
Merkez Tic.Sic.No : 68 911 / Mersis No : 0802001880800011
Antalya Fabrika Tic.Sic.No : 42842 / Mersis No : 0802001880800055
Antalya 2 Şube Tic.Sic.No : 19822 / Mersis No : 0802001880800072
Antalya 3 Şube Tic.Sic.No : 40975 / Mersis No : 0802001880800013
Gebze Şubesi Tic.Sic.No : 28740 / Mersis No : 0307001880300014

24 89

Çilekte pamuk kırmızıörümceğine karşı:

Erken dönem uygulaması: Kırmızıörümceklerin her yıl sorun olduğu çilek alanlarında çiçek ve yeşil meyve döneminde (ilk olgun meyveler görülmeden önce) kırmızıörümcekler görüldüğünde bir uygulama yapılmalıdır. Erken dönem uygulaması meyvelerde kalıntı bırakmaması için daha güvenlidir.

Mevsim içi uygulaması: Erken dönem uygulamasının yapılmadığı durumlarda, açığa yetiştirilen çilekler mevsim başında (Mart sonu - Nisan başı) 3-5 gün aralıklarla kontrol edilir. Kırmızıörümcekler çilekte mevsim başında çevredeki bitkilerde görülür. Öncelikle bu bitkilerin kontrol edilmesi ve uygulanması yeterlidir. Popülasyonun yaygınlık göstermesi durumunda tarlayı temsil edecek şekilde bitkinin orta ve alt bölümlerinde en az 50 yaprakçık incelenir. Yaprakçık başına 15 ve üzerinde kırmızıörümcek tespit edilmesi halinde uygulamaya karar verilir. Meyve toplanmasından hemen sonra uygulama yapılır. Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek hasat yapılmalıdır.

Pamukta kırmızıörümceklere karşı mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararlı yalnız tarla kenarında yada içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlara uygulama yapılmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesinde 5 adet, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 10 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Gül ve Karanfilde kırmızıörümceklere karşı ekim alanları sık sık kontrol edilerek özellikle yaprakların altında kırmızıörümcekler aranır. Lokal bulaşma tespit edildiğinde uygulama sadece buralarda, sera veya açık alanlarda genelde yaygın bir bulaşmaya rastlandığından tamamına uygulama yapılır

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

KARIA 20 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 21A olarak sınıflandırılmış bir insektisit + akarisit. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **KARIA 20 WP**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 21A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.



DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.

KARIA 20 WP

Islanabilir Toz (WP)

Grubu	21A	Insektisit + Akarisit (Böcek ve Kırmızıörümcek İlacı)
-------	-----	--

%20 Tebufenpyrad

10 Ocak 2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



DOĞAL KİMYEVİ MADDELER
ve ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Toplamı Sk. No:16 34810 Anadoluhisari Beykoz/İST. Yeniköy K/D. 3020610109
Merkez Tic.Sic.No : 68-8 Mersis No : 0902011830800011
Antalya Fabrika Tic.Sic.No : 42447 Mersis No : 0307001830800015
Antalya 2 Şube Tic.Sic.No : 100272 Mersis No : 0307001830800012
Ant. İya 3 Şube Tic.Sic.No : 100938 Mersis No : 0307001830800013
Gebze Şubesi Tic.Sic.No : 28710 Mersis No : 0307001830800014

Murat BAY/SAL
Yurtiçi Satış Müdürü

TK 39