

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 06.10.2017 / 10961

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ *	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	50 g/100 L su	7 gün
Domates	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	60 g/100 L su	7 gün
Biber (Sera)	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	60 g/100 L su	7 gün
Hıyar (Sera)	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	60 g/100 L su	7 gün
Kornişon (Sera)	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	60 g/100 L su	7 gün
Kiraz	Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (<i>Monilinia laxa</i> = <i>Sclerotinia laxa</i>)	35 g/100 L su	7 gün
Çilek	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	60 g/100 L su	7 gün
Patlıcan (Sera)	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	60 g/100 L su	7 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılır, ilaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanınca kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmamızdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağda kurşuni küf:

Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde; birinci uygulama tanelerin olgunluk başlangıcında yapılır. İkinci ve diğer uygulamalar kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak yapılmalıdır. Son uygulama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgelerinde; birinci uygulama çiçeklenmeden hemen önce yapılır. İkinci uygulama kapalı salkım döneminde yapılır. Üçüncü ve diğer uygulamalar kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak yapılmalıdır. Son uygulama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

Domates, Biber (Sera), Hıyar (Sera), Kornişon (Sera) ve Patlıcan (Sera) kurşuni küf: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme döneminde iken uygulamaya başlanmalıdır. Uygulamalar 10 gün ara ile yapılmalıdır.

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Kiraz): Birinci uygulama çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte) yapılır. İkinci uygulama tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır.

M. Zulu



**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.**

FESTAN

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

Grubu	D1:9	E2:12	Fungisit (Mantar İlacı)
%37,5 Cyprodinil + %25 Fludioxonil			

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA
KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.

Göz ile teması halinde: Yanma geçinceye kadar temiz su ile yıkanmalıdır.
Deri ile teması halinde: Uzun süreli temaslarda, su ve sabun ile yıkanıp uzun süre durulanmalıdır. Kimyasal bulaşmış elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır.

Soluması halinde: Derhal temiz havaya çıkarılmalı, solunum durmuş ise suni teneffüs yaptırılmalıdır. Solunum zor ise oksijen verin. Doktora başvurun.

Yutulması halinde: Şuuru yerinde olmayana kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin. Acilen doktor çağırın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulayın.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

13 Şubat 2024
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



Net Miktarı:
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Cyprodinil, Fludioxonil, Sodyum sülfat, Sodyum liginosülfonat



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

- H315: Cilt tahrişine yol açar.
 - H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
 - H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
 - H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
 - H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
 - H412: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
- ÖNLEM İFADELERİ:**
- P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyni solumaktan kaçınınız.
 - P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üz koruyucu kullanınız.
 - P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.
 - EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız.
- Bitki koruma ürününü kendi ambalajlarında kapalı olarak, kuru ve serin yerde saklayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.**

Üretim Tesisi: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA
Merkez: Toplarönü Sok. No: 16 Anadoluhisarı / İSTANBUL
Tel: (0216) 308 65 87 - 90 Fax: (0216) 308 65 84

**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER
ve ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**

Toplarönü Sk. No: 16 34810 Anadoluhisarı Beykoz/İST. Yabancı V.D. 302 311 958
Merkez Tic.Sic.No : 68 8 Mersis No : 030700100000011
Antalya Fabrika Tic.Sic.No : 47447 Mersis No : 030700100000015
Antalya 2 Şube Tic.Sic.No : 100272 Mersis No : 030700100000012
Antalya 3 Şube Tic.Sic.No : 169536 Mersis No : 030700100000013
Gebze Şubesi Tic.Sic.No : 28710 Mersis No : 030700100000014

Murat BAYSAK
Yurtiçi Satış Müdürü

Çilekte kurşuni küf: Birinci uygulama ilk çiçeklerin %10'u açtığı dönemde yapılır. İkinci uygulama çiçeklerin %50'sinin açtığı dönemde yapılır. Üçüncü uygulama ilk yeşil meyvenin görüldüğü dönemde yapılır. Dördüncü ve diğer uygulamalar ise kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi ve son uygulama ile her bir hasat arasında geçmesi gereken süre dikkate alınarak enfeksiyon koşulları ortadan kalkıncaya kadar devam edilir.

BİTKİ TAHAMMÜLÜ:

Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında tavsiye edildiği kültür bitkileri üzerinde herhangi olumsuz bir etkisi yoktur. Tereddüt halinde hassas ve yeni çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilmelidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

FESTAN adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup D1:9 / E2:12 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **FESTAN**'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup D1:9 / E2:12 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.



**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.**

FESTAN

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

Grubu	D1:9	E2:12	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	------	-------	----------------------------

%37,5 Cyprodinil + %25 Fludioxonil

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER

ve ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Teşkilatı Sic. No: 16 31813 Anadolu İşleri Bld. Kat: 10. Kat No: 10/100010000
Mihalıççık Tic. Sic. No: 68-8 Mersis No: 0697001000000011
Antalya Fabrika Tic. Sic. No: 42447 Mersis No: 0706001000000015
Antalya 2 Şube Tic. Sic. No: 100272 Mersis No: 0807001000000012
Antalya 3 Şube Tic. Sic. No: 100938 Mersis No: 0807001000000013
Gebze Şubesi Tic. Sic. No: 28710 Mersis No: 0302001000000014

Murat BAYSAZ
Yurtiçi Satış Müdürü

13 Şubat 2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

