

İmal Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Şarj No:

Ruhsat Tarih ve No.su: 15.02.2013 / 9093

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANILACAK BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi
Bağ *	Köpekdişi ayrığı Kanyaş	( <i>Cynodon dactylon</i> ) ( <i>Sorghum halepense</i> ) 100 ml/da Köpekdişi ayrığı 15-20 cm, kanyaş 2-3 kardeşte iken
Domates	Köpekdişi ayrığı Darıcan Kanyaş	( <i>Cynodon dactylon</i> ) ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) ( <i>Sorghum halepense</i> ) 100 ml/da Domates 15-20 cm boyda, yabancı otlar 3-6 yapraklı dönemde, Çıkış sonrası
Ayçiçeği	Tilkikuyruğu Brom Köpekdişi ayrığı Darıcan Yabani arpa Yabani dari Çayır püskülü Yapışkan dari Kanyaş	( <i>Alopecurus myosuroides</i> ) ( <i>Bromus spp.</i> ) ( <i>Cynodon dactylon</i> ) ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) ( <i>Hordeum spontaneum</i> ) ( <i>Panicum spp.</i> ) ( <i>Poa spp.</i> ) ( <i>Setaria spp.</i> ) ( <i>Sorghum halepense</i> ) 100 ml/da Ayçiçeği ve yabancı otların 3-4 yapraklı olduğu dönemde, Çıkış sonrası
Soğan	Darıcan Yapışkan dari Kanyaş	( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) ( <i>Setaria spp.</i> ) ( <i>Sorghum halepense</i> ) 100 ml/da Soğan 15-20 cm boyda, kanyaş 3-5 yapraklı, darıcan ve yapışkan dari 10-15 cm boyda iken
Kırmızı mercimek	Tilkikuyruğu Kısır yabani yulaf Kendi gelen arpa Kendi gelen buğday	( <i>Alopecurus myosuroides</i> ) ( <i>Avena sterilis</i> ) ( <i>Hordeum vulgare</i> ) ( <i>Triticum aestivum</i> ) 75 ml/da Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde, Çıkış sonrası
	Ayrık	( <i>Elymus repens</i> ) 100 ml/da Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde, Çıkış sonrası
Şekerpancarı	Tilkikuyruğu Yabani yulaf Püskülü çayır Darıcan	( <i>Alopecurus myosuroides</i> ) ( <i>Avena fatua</i> ) ( <i>Bromus tectorum</i> ) ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) 75-100 ml/da Yıllık yabancı otlarda düşük, çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır.
Pamuk	Kanyaş	( <i>Sorghum halepense</i> ) 75-100 ml/da Tohumdan gelenlerde düşük, rizomdan gelenlerde yüksek doz uygulanır.
Soya fasulyesi	Tilkikuyruğu Köpekdişi ayrığı Darıcan Kuşyemi Yabani dari Kanyaş	( <i>Alopecurus myosuroides</i> ) ( <i>Cynodon dactylon</i> ) ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) ( <i>Phalaris spp.</i> ) ( <i>Panicum spp.</i> ) ( <i>Sorghum halepense</i> ) 100 ml/da Yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu döneme, Çıkış sonrası
Kanola	Delice	( <i>Lolium temulentum</i> ) 200 ml/da Çıkış sonrası
	Tilkikuyruğu Kısır yabani yulaf Köpekdişi ayrığı Kuşyemi Çayır püskülü Yapışkan dari Kendi gelen buğday	( <i>Alopecurus myosuroides</i> ) ( <i>Avena sterilis</i> ) ( <i>Cynodon dactylon</i> ) ( <i>Phalaris spp.</i> ) ( <i>Poa spp.</i> ) ( <i>Setaria spp.</i> ) ( <i>Triticum aestivum</i> ) 100 ml/da Çıkış sonrası
Nohut	Tilkikuyruğu Yabani yulaf Kendi gelen buğday	( <i>Alopecurus myosuroides</i> ) ( <i>Avena fatua</i> ) ( <i>Triticum aestivum</i> ) 75 ml/da Çıkış sonrası

\* Tüketicim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacaktır bağ alanlarında kullanılmaz.



GIDA TARIM VE HAYVANCIKLIK BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL İMAMLIĞI  
KABUL EDİLMİŞTİR



## DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A. Ş.

### SORTİ SUPER

#### Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	A,1	Herbisit (Yabancı ot İlacı)
		50 g/l Quizalofop-p-ethyl

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayın.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayın.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayın.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

#### TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DİŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik ve bulanık görme görülebilir.

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.

**Göz ile teması halinde:** Yanma geçinceye kadar temiz su ile yıkamalıdır.

**Deri ile teması halinde:** Uzun süreli temaslarda, su ve sabun ile yıkınip uzun süre durulmalıdır. Kimyasal bulanmış elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır.

**Solunması halinde:** Derhal temiz havaya çıkarılmalı, solunum durmuş ise suni teneffüs yaptırılmalıdır. Solunum zor ise oksijen verin. Doktora başvurun.

**Yutulması halinde:** Şuuru yerinde olmayana kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin. Acilen doktor çağırın.

#### ANTİDOTO VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidot yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

#### ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

25 Ocak 2018

Net Miktarı:  
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Quizalofop-p-ethyl, Xylool



DİKKAT

#### ZARARLILIK İFADELERİ:

H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H315: Cilt tahririye yol açar.

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.

#### ÖNLEM İFADELERİ:

P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyi solumaktan kaçının.

P264: Eleğlemeden sonra bol su ile iyice yıkın.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P370+378: Yangın durumunda: Söndürme için KKT kullanın.

P501: İgeni/kabi Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığını ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanım talimatlarına uyın.

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arıala zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayın.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayın.
- Depodaki diğer bitki koruma ürünlerile karışmasına mani olunuz.
- Boşalan ambalajları başka amaçlar için kullanmayın.
- Tohumla temas ettirmeyin.
- Buğdayıllere karşı fitotoksiktir.

#### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fizikalik, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

#### FİRMİ BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

#### ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMASI:

#### DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A. Ş.

Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA

Merkez: Toplaronı Sok. No:16 Anadoluhisarı / İSTANBUL

Tel: (0216) 308 65 87 - 90 Fax: (0216) 308 65 84

#### DOĞAL KİMYEVİ MADDELER ve ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ ve İCARET A.Ş.

Toplaronı Sk. No:16/34810 Anadoluhisarı Beykoz/İSTANBUL

A.Ş. Kullanıcı V.D.: 30.0018808 Muster Tic. Sic. No: 68-Kadıköy

İtalya Sube Ticaret Sicil No: 4447-4454 Antalya

Merket Alışveriş No: 0-3026188-00011

Antalya Sube Alışveriş No: 2-82445336-021190

*Uğur TASKAN*  
Ziraat Mühendisi  
Ruhsatlandırma

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:**

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarına kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırıma devam edilecek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**KALİBRASYON:**

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

**İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:**

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayın. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ:**

Bitki koruma ürünü yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu ve hızlı bir gelişme gösterdikleri genç dönemlerinde (Kanya için bu dönem yabancı otların 30 cm oldukları dönemdir.) yabancı otların üzerine püskürtülmek sureti ile kullanılır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlamalıdır. Yabancı otların gelişimlerinin çok yavaş olduğu kurak şartlarda ve düşük sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.

**DİRENÇ YÖNETİMİ:**

**SORTİ SUPER** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A,1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **SORTİ SUPER**'nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerekişi durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A,1 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU:**

Alkali karakterdeki bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.



DOĞAL

**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR  
SAN. VE TİC. A.Ş.**

**SORTİ SUPER**

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	A,1	Herbisit (Yabancı ot İlacı)
50 g/l Quizalofop-p-ethyl		

**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER  
ve ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**  
 Topluluğu Sk. No:16/04810 Anadoluhisarı Beykoz/İSTANBUL  
 A.Kırmızılar V.D.: 30/0018808 Mənzəz Tic. Sic. No: 68-Kadıköy  
 Antalya İda. Ticaret Sic. No: 41447 - 41653 Antalya  
 Merkez Ofisi No: 0-3020-0188-0801  
 Antalya Şube Sic. No: 2-82-45356-6211596

**Uğur TASKAN**  
Ziraat Mühendisi  
Ruhsatlandırma

25 Ocak 2018

GIDA TARIM VE HAYVANÇİLİK BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

N  
 Dr. Uğur TASKAN  
 Genel Müdür Yardımcısı