

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 15.02.2013 / 9093

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR:

| Bitki Adı | Kontrol Ettiği Yabancı Otlar | Uygulama Dozu ve Dönemi |
|------------------|--|---|
| Bağ * | Köpekdişi ayrığı Kanyaş (<i>Cynodon dactylon</i>) (<i>Sorghum halepense</i>) | 100 ml/da Köpekdişi ayrığı 15-20 cm, kanyaş 2-3 kardeşle iken |
| Domates | Köpekdişi ayrığı Darıcan Kanyaş (<i>Cynodon dactylon</i>) (<i>Echinochloa crus-galli</i>) (<i>Sorghum halepense</i>) | 100 ml/da Domates 15-20 cm boyda, yabancı otlar 3-6 yapraklı dönemde, Çıkış sonrası |
| Ayçiçeği | Tilkikuyruğu Brom Köpekdişi ayrığı Darıcan Yabani arpa Yabani darı Çayır püskülü Yapışkan darı Kanyaş (<i>Alopecurus myosuroides</i>) (<i>Bromus spp.</i>) (<i>Cynodon dactylon</i>) (<i>Echinochloa crus-galli</i>) (<i>Hordeum spontaneum</i>) (<i>Panicum spp.</i>) (<i>Poa spp.</i>) (<i>Setaria spp.</i>) (<i>Sorghum halepense</i>) | 100 ml/da Ayçiçeği ve yabancı otların 3-4 yapraklı olduğu dönemde, Çıkış sonrası |
| Soğan | Darıcan Yapışkan darı Kanyaş (<i>Echinochloa crus-galli</i>) (<i>Setaria spp.</i>) (<i>Sorghum halepense</i>) | 100 ml/da Soğan 15-20 cm boyda, kanyaş 3-5 yapraklı, darıcan ve yapışkan darı 10-15 cm boyda iken |
| Kırmızı mercimek | Tilkikuyruğu Kısır yabani yulaf Kendi gelen arpa Kendi gelen buğday Ayrık (<i>Alopecurus myosuroides</i>) (<i>Avena sterilis</i>) (<i>Hordeum vulgare</i>) (<i>Triticum aestivum</i>) (<i>Elymus repens</i>) | 75 ml/da Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde, Çıkış sonrası 100 ml/da Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde, Çıkış sonrası |
| Şekerpancarı | Tilkikuyruğu Yabani yulaf Püsküllü çayır Darıcan (<i>Alopecurus myosuroides</i>) (<i>Avena fatua</i>) (<i>Bromus tectorum</i>) (<i>Echinochloa crus-galli</i>) | 75-100 ml/da Yıllık yabancı otlarda düşük, çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır. |
| Pamuk | Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) | 75-100 ml/da Tohumdan gelenlerde düşük, rizomdan gelenlerde yüksek doz uygulanır. |
| Soya fasulyesi | Tilkikuyruğu Köpekdişi ayrığı Darıcan Kuşyemi Yabani darı Kanyaş (<i>Alopecurus myosuroides</i>) (<i>Cynodon dactylon</i>) (<i>Echinochloa crus-galli</i>) (<i>Phalaris spp.</i>) (<i>Panicum spp.</i>) (<i>Sorghum halepense</i>) | 100 ml/da Yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu dönemde, Çıkış sonrası |
| Kanola | Delice (<i>Lolium temulentum</i>) | 200 ml/da Çıkış sonrası |
| | Tilkikuyruğu Kısır yabani yulaf Köpekdişi ayrığı Kuşyemi Çayır püskülü Yapışkan darı Kendi gelen buğday (<i>Alopecurus myosuroides</i>) (<i>Avena sterilis</i>) (<i>Cynodon dactylon</i>) (<i>Phalaris spp.</i>) (<i>Poa spp.</i>) (<i>Setaria spp.</i>) (<i>Triticum aestivum</i>) | 100 ml/da Çıkış sonrası |
| Nohut | Tilkikuyruğu Yabani yulaf Kendi gelen buğday (<i>Alopecurus myosuroides</i>) (<i>Avena fatua</i>) (<i>Triticum aestivum</i>) | 75 ml/da Çıkış sonrası |

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

11 Temmuz 2023



**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.**

SORTI SUPER

Emülsiyon Konsantre (EC)

| | | |
|-------|-----|--------------------------------|
| Grubu | A:1 | Herbisit (Yabancı ot ilacı) |
|-------|-----|--------------------------------|

50 g/L Quizalofop-p-ethyl

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA
KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.
Göz ile teması halinde: Yanma geçinceye kadar temiz su ile yıkanmalıdır.
Deri ile teması halinde: Uzun süreli temaslarda, su ve sabun ile yıkanıp uzun süre durulanmalıdır. Kimyasal bulaşmış elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır.
Solunması halinde: Derhal temiz havaya çıkarılmalı, solunum durmuş ise suni teneffüs yaptırılmalıdır. Solunum zor ise oksijen verin. Doktora başvurun.
Yutulması halinde: Şuuru yerinde olmayana kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin. Acilen doktor çağırın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114



Mehmet Murat TÜRKMEROĞLU
İş Geliştirme ve Teknik Tanımdan
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Net Miktarı:
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Quizalofop-p-ethyl, Xylol



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.

ÖNLEM İFADELERİ:

P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyni

solumaktan kaçınınız.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/ yüz

koruyucu kullanınız.

P370+378: Yangın durumunda: Söndürme için KKT

kullanınız.

P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf

edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek

için, kullanma talimatlarına uyunuz.

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR:**

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- Boş bitki koruma ürünün ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız.
- Bitki koruma ürününü kendi ambalajlarında kapalı olarak, kuru ve serin yerde saklayınız.
- Tohumla temas ettirmeyiniz.
- Buğdaygillere karşı fitotoksiktir.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.


RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.

Üretim Tesis: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA

Merkez: Toplarönü Sok. No: 16 Anadoluhisari / İSTANBUL

Tel: (0216) 308 65 87 - 90 Fax: (0216) 308 65 84



BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bitki koruma ürünü yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu ve hızlı bir gelişme gösterdikleri genç dönemlerinde (Kanyaş için bu dönem yabancı otların 30 cm oldukları dönemdir.) yabancı otların üzerine püskürtülmek sureti ile kullanılır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlanmalıdır. Yabancı otların gelişimlerinin çok yavaş olduğu kurak şartlarda ve düşük sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

SORTI SUPER adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A:1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **SORTI SUPER**'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A:1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Alkali karakterdeki bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.



DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.

SORTI SUPER


Emülsiyon Konsantre (EC)

| | | |
|-------|-----|--------------------------------|
| Grubu | A:1 | Herbisit (Yabancı ot ilacı) |
|-------|-----|--------------------------------|

50 g/L Quizalofop-p-ethyl

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

11 Temmuz 2023



Handwritten signature