

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 05.03.2024 / 13043

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates (Sera)	Kök-ur nematodları (<i>Meloidogyne spp.</i>)	60 ml/da	7 gün
Biber (Sera)	Kök-ur nematodları (<i>Meloidogyne spp.</i>)	60 ml/da	14 gün
Hıyar (Sera)	Kök-ur nematodları (<i>Meloidogyne spp.</i>)	60 ml/da	7 gün
Kornişon (Sera)	Kök-ur nematodları (<i>Meloidogyne spp.</i>)	60 ml/da	7 gün
Patates	Kök-ur nematodları (<i>Meloidogyne spp.</i>)	120 ml/da	-

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanınca kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Damla Sulama Sisteminin Kalibrasyonu: Baştan ve sondan 3 memenin 10 dakika çalıştırılarak debisi ölçülür. Sapma %10'u geçmemelidir. Dekara verilecek bitki koruma ürünü miktarı belirlenir.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Damla Sulama Sisteminin Temizliği: Damla sulama sistemi ile yapılan uygulamalardan sonra, tank temiz su ile doldurularak, sistemi çalıştırılarak tankın ve damla sulama sisteminin temizlenmesi sağlanır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Domates (Sera), Biber (Sera), Hıyar (Sera) ve Kornişon (Sera): Önce damla sulama sistemi çalıştırılarak toprak tarla kapasitesine gelene kadar su verilir. Daha sonra birim alana uygulanacak ürün miktarı ayrı bir kapta hazırlanıp damla sulama sistemiyle uygulama alanına verilir ve arkasından 15-20 dakika tekrar temiz su verilerek ürünün toprağa nüfuz etmesi sağlanır. Sulama ve uygulamalar sırasında suyun homojen olarak dağılmasına ve bitkinin etkili kök bölgesine inmesine dikkat edilmelidir.

Domates (Sera), Biber (Sera), Hıyar (Sera) ve Kornişon (Sera) için iki uygulama yapılması gerekmektedir.

1. uygulama (60 ml/da dozda) fide şaşırtıldıktan 1 gün sonra,
2. uygulama (60 ml/da dozda) ise ilk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.
Önerilen uygulama sayısını (2 uygulama) aşmayınız.

Patates: STELLUM 400 SC patates bitkisinin ekiminden önce, keseksiz iyi hazırlanmış toprağın yüzeyine satih uygulaması şeklinde yapılmalıdır. Uygulamadan sonra toprak diskaro aleti ile karıştırıldıktan hemen sonra patatesler ekilmelidir.

Patateste Kök-ur nematodlarına'na karşı ekim öncesi 120 ml/da doz bir defada uygulanır.



**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.**

STELLUM 400 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	C2:7	Nematisit (Nematod İlacı)
-------	------	------------------------------

400 g/L Fluopyram

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 4 saat insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.

Göz ile teması halinde: Yanma geçinceye kadar temiz su ile yıkanmalıdır.

Deri ile teması halinde: Su ve sabun ile yıkanıp uzun süre durulanmalıdır.

Kimyasal bulaşmış elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır.

Soluması halinde: Hastayı temiz havaya çıkarın ve sakin bir yerde tutun.

Yutulması halinde: Doktor çağırın. Bitki koruma ürününün ambalaj ve etiketini yanınızda götürün.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114



- 5 Mart 2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Net Miktarı:
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Fluopyram Teknik



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

EUH208: Biyosit içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ:

P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyni

solumaktan kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz

koruyucu kullanın.

P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Anılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- Boş bitki koruma ürünün ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız.
- Bitki koruma ürününü kendi ambalajlarında kapalı olarak, kuru ve serin yerde saklayınız.

DİKKAT: Kullanmadan önce iyice çalkalayınız!

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.**

Üretim Tesisi: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA
Merkez: Toplarönü Sok. No:16 Anadoluhisari / İSTANBUL

Tel: (0216) 308 65 87 - 90 Fax: (0216) 308 65 84



DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

STELLUM 400 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C2:7 olarak sınıflandırılmış bir nematosttir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **STELLUM 400 SC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C2:7 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırılmaz.



DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.

STELLUM 400 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	C2:7	Nematisit (Nematod İlacı)
-------	------	------------------------------

400 g/L Fluopyram

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER

ve ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİCARET A.Ş.

Tekirdağ San. Tic. Sic. No: 158110 / Mersis No: 0302001390000011
Mardin Tic. Sic. No: 158110 / Mersis No: 0302001390000011
Antalya Tic. Sic. No: 158110 / Mersis No: 0302001390000011
Antalya 2. Sic. No: 158110 / Mersis No: 0302001390000011
Antalya 3. Sic. No: 158110 / Mersis No: 0302001390000011
Gebze Tic. Sic. No: 158110 / Mersis No: 0302001390000011

Metmet Murat TÜRKMEÑOĞLU

İş Geliştirme ve Teknik Tanıtımdan
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

- 5 Mart 2024

İÇİŞİ VE ORMAN BAKANLIĞI
İÇİŞİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

