

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 19.04.2010 / 7678

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Turunçgil *	Turunçgil siyah yaprakbiti (<i>Toxoptera auranti</i>)	30 g/100 L su (nimf, ergin)	21 gün
	Turunçgil yeşil yaprakbiti (<i>Aphis citricola</i>)		
	Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)		
	Börülce yaprakbiti (<i>Aphis craccivora</i>)		
Elma	Elma yeşil yaprakbiti (<i>Aphis pomi</i>)	30 g/100 L su (nimf, ergin)	21 gün
	Şeftali gövde kanlıbiti (<i>Pterochloroides persicae</i>)	50 g/100 L su (ergin)	
Şerbetçiotu	Şerbetçiotu yaprakbiti (<i>Phorodon humuli</i>)	50 g/100 L su (nimf, ergin)	7 gün
Pamuk **	Pamuk yaprakbiti (<i>Aphis gossypii</i>)	25 g/da (nimf, ergin)	7 gün
Şekerpancarı	Bakla yaprakbiti (<i>Aphis fabae</i>)	50 g/da (nimf, ergin)	7 gün
	Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)		
Domates (Sera)	Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	50 g/100 L su (nimf, ergin)	7 gün
Biber (Sera)	Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	50 g/100 L su (nimf, ergin)	7 gün

* Turunçgilde faydalılara karşı zararsız olduğu tespit edilmiştir.

** Pamuk yaprakbitine karşı yalnızca Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kullanılır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR

SAN. VE TİC. A. Ş.
PANZHER

İslenabilir Toz (WP)

Grubu	1A	Insektisit (Böcek İlacı)
-------	----	--------------------------

%50 Pirimicarb

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 2 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.

Göz ile teması halinde: Yanma geçinceye kadar temiz su ile yıkanmalıdır.

Deri ile teması halinde: Uzun süreli temaslarda, su ve sabun ile yıkayıp uzun süre durulanmalıdır. Kimyasal bulaşmış elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır.

Solunması halinde: Derhal temiz havaya çıkarılmalı, solunum durmuş ise suni teneffüs yaptırılmalıdır. Solunum zor ise oksijen verin. Doktora başvurun.

Yutulması halinde: Şuuru yerinde olmayan keskinlikle ağızdan bir şey vermeyin. Acilen doktor çağırın.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulayın.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

Net Miktarı:
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Pirimicarb, Sodium lignosulfonate, Kaolen



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

- H301: Yutulması halinde toksiktir.
 - H315: Cilt tahrişine yol açar.
 - H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
 - H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
 - H372: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar.
 - H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
- ÖNLEM İFADELERİ:**
- P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyni solumaktan kaçının.
 - P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
 - P280: Korumaya eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
 - P405: Kilit altında saklayın.
 - P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.
 - EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Anılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü kendi ambalajlarında kapalı olarak, kuru ve serin yerde saklayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A. Ş.

Üretim Tesisi: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA
Merkez: Toplarönü Sok. No: 16 Anadoluhisarı / İSTANBUL
Tel: (0216) 308 65 87 - 90 Faks: (0216) 308 65 84



27 Eylül 2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Turunçgilde turunçgil siyah yaprakbiti, turunçgil yeşil yaprakbiti, şeftali yaprakbiti ve börülce yaprakbiti: Uygulamaya karar vermeden önce bahçedeki zarar oranları ve türler belirlenmelidir. İlkbaharda ağaçlar kontrol edilmeli ve ağaç başına ortalama 15'ten fazla sürgün bulaşksa bahçedeki parazitoid ve predatörlere etkisi az olan spesifik afisitler kullanılmalıdır. Genel olarak uygulamalardan kaçınılmalı veya nokta uygulama yapılmalıdır. Pirimicarb etkili maddeli bitki koruma ürünleri *Aphis gossypii*'ye karşı etkilisizdir. Yaz aylarında uygulamalardan kesinlikle kaçınılmalıdır.

Elmada elma yeşil yaprakbiti: Vegetasyon süresince 15 bulaşık sürgün görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Şerbetçiotu yaprakbiti: Kış konukçularından gelen kanatlı dişilerin uçmaları takip edilmeli ve uçuşun en yüksek noktaya ulaştığı günü izleyen bir hafta içinde ilk uygulama yapılmalıdır. Daha sonra 100 ocaktan tesadüfen seçilen birer yaprakta yapılan sayımlarda bulaşma oranı %20 ve bulaşık yapraklarda ortalama yaprakbiti sayısı 20 ise uygulama tekrarlanmalıdır.

Pamukta pamuk yaprakbiti: Tarla kontrollerinde yaprakbiti ile birlikte faydalı böcekler yoğun ise uygulama ertelenmelidir. Tarla döneminde bir yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında mücadele önerilir.

Şekerpancında bakla yaprakbiti ve şeftali yaprakbiti: 25 bitkinin göbek yapraklarından biri alınır. Yaprak başına en az 25 yaprakbiti varsa uygulama yapılır. Uygulama sayısı tektir.

Domates (Sera) ve Biber (Sera) şeftali yaprakbiti: Uygulama zamanını belirlemek amacıyla üretim alanına köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden birer adet koparılarak 20-40 yaprakta yaprak başına ortalama 10-20 adet zararlı görüldüğünde uygulama yapılır. Bununla birlikte parazitoid ve predatörler gözlenerek uygulamaya karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

PANZHER adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1A olarak sınıflandırılmış bir insektisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **PANZHER**'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmıyınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.



**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.**

PANZHER

Islanabilir Toz (WP)

Grubu	1A	Insektisit (Böcek Ilacı)
-------	----	-----------------------------

%50 Pirimicarb

[Handwritten signature]

27 Eylül 2023

**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.**



**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER
ve ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**
Yatırım No: 16/2013
M. Kemal Tr. No: 104
A. No: 104
Antalya Z. Şişli Tr. No: 104
Gebze Gebze Tr. No: 104

Mehmet Murat TÜRKMEŒLU
İş Geliştirme ve Teknik Tanıtımdan
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi