

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 13.11.2008 / 6664

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hesat Arasındaki Süre
Tütün	Tatlı kurt (<i>Lasioderma serricorne</i>)	30 ml/100 m ² (En fazla 5 litre su ile) (Boş ambar)	15 gün
	Tütün güvesi (<i>Ephestia elutella</i>)		
	Tütün tripsi (<i>Thrips tabaci</i>)	30 ml/da	14 gün
Kuru incir	Testereli böcek (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>)	30 ml/100 m ² (En fazla 5 litre su ile) (Boş ambar-Yüzey ilaçlaması)	49 gün
Kuru üzüm			
Elma	Elma içkurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	7,5 ml/100 l su	3 gün
Kiraz	Kiraz sineği (<i>Rhagoletis cerasi</i>)	15 ml/100 l su	3 gün
Vişne	Kiraz sineği (<i>Rhagoletis cerasi</i>)	15 ml/100 l su	3 gün
Zeytin	Zeytin sineği (<i>Bactrocera oleae</i>)	12,5 ml/100 l su	21 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanınca kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

ILAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Tütünde tatlı kurt ve tütün güvesine karşı: Boş depolarda, ambar temizliği yapıldıktan sonra uygulama yapılmalıdır. 100 m² için gerekli olan su miktarı hesaplanmalıdır. Uygulamalarda önce pencereler, kapılar ve havalandırma sistemleri kapanmalıdır. m² üzerinden tavsiye edilen bitki koruma ürünü miktarı, hiç kuru yer kalmayacak şekilde bütün yüzeylere uygulanmalıdır.

Tütün tripsi: Yapılan surveylerde 5 cm²'lik yaprak alanında en az 5 adet "larva+pupa" görüldüğünde ilaçlama yapılır. İlaçlama çiğ kalktıktan sonra, sabah erken veya akşam geç saatlerde ve rüzgarsız bir havada yaprakların alt yüzlerini de kaplayacak şekilde yapılmalıdır.

Kuru meyve zararlılarına karşı:

Boş ambar uygulaması gerekli kültürel önlemler alındıktan ve ambar kireçle badana edildikten sonra yapılır.

Fumigasyon depolama öncesi dönemde bulaşma olmuş ürünlere, depolamanın başında yapılır.

Dolu ambar uygulaması depolama süresinde bulaşma görüldüğü takdirde uygulanır. Bu uygulama ostikolu tuzaklarda 3-4, açık tuzaklarda 10-15 ergin böcek görüldüğünde yapılır.

Elma içkurdu: Elma iç kurdu mücadelesinde hedef, her dölle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulunduran, yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. Ancak, bu mücadelede üründe %2'ye kadar zarar göz ardı edilebilir. Bu nedenle, zararlının popülasyon seviyelerinin bilinmesi ayrı bir önem taşır. Döllere ait ilk ilaçlama zamanlarını sağlıklı bir şekilde saptamada ve yoğunluğun tespit edilmesinde tahmin ve uyarı yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemlere göre ilaçlamaya karar verdikten sonra birinci dölle karşı 2, ikinci dölle karşı 1 olmak üzere toplam 3 ilaçlama yapılmakta ve genellikle bu uygulama yeterli olmaktadır.



**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.**

DEKAGARD 5 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	3A	Insektisit (Böcek İlacı)
-------	----	--------------------------

50 g/l Deltamethrin

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA
KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHRİLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.

Göz ile teması halinde: En az 15 dakika temiz su ile yıkanmalıdır.

Deri ile teması halinde: Bol su ve sabun ile yıkanıp uzun süre durulanmalıdır.

Soluması halinde: Temiz havaya çıkartın. Hastayı sıcak tutun ve kırırdatmayıp, dinlendirin. Semptomlar devam ederse doktora başvurun.

Yutulması halinde: Acil doktora başvurun. Gerekğinde ULUSAL ZEHRİ DANIŞMA MERKEZİ'ni (UZEM) arayın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHRİ DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

10 Haziran 2020

Net Miktarı:
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Deltamethrin, Monopropilen glikol



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.

EUH066: Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- Kullanmadan önce ambalajı iyice çalkalayınız.
- Sulandırma sonrası, bekletmeden hemen uygulayınız.
- Astım, saman nezlesi ve alerjisi olanlar temas etmemelidir.
- Boş ürün ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız.

DİKKAT: Kullanmadan önce iyice çalkalayınız!

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER

ve ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Toprakönü Sokak No: 15 34810 Anadoluhisar

Beykoz / İSTANBUL Yürüklüğü V.D. 2020010008

Merket Tic. Sic. No: 48 - B Merkez No: 030200183600011

Antalya Fak. Tic. Sic. No: 42447-44444 Merkez No: 0302001836000115



Murat BAYSAL
Yurtiçi Satış Müdürü

Kiraz sineği: Bölgelere göre değişmekle birlikte nisan-mayıs aylarında "görsel sarı yapışkan tuzak+amonyak kapsülü" 2 adet/dekar olacak şekilde kiraz bahçelerine ağaçların güneydoğu yönüne asılır. İlaçlama tuzaklarda ilk ergin görüldükten sonra en geç bir hafta içinde yapılır. Genellikle bir ilaçlama yeterli olmaktadır. Ancak, birinci ilaçlamadan sonra, tuzaklardaki sinek yakalanmaları devam ediyorsa, ilacın etki süresi ve hasat tarihi dikkate alınarak ikinci ilaçlama yapılabilir.

Zeytin sineği: Ergin çıkış zamanları iklim, toprak karakteri, çeşit vb. etkenlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bölge farklılıkları dikkate alınarak, meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde vuruş sayımları yapılarak, yeterli vuruş ve tuzaklarda yakalanan Zeytin sineği ergin sayısında artış görülmesi halinde, ilaçlamaya geçilmelidir. Bu nedenle tuzakların haziran ayının ilk yarısına kadar asılması gerekmektedir. Vuruş sayımları haftada 1-2 kez, ağaçların güney-doğu kısımlarındaki parlak, yağlanmaya başlamış, flüoresans sarı renkteki meyvelerde yapılarak, vuruş yüzdesi belirlenir. Kitle halinde tuzakla yakalama ve kısmi dal ilaçlaması için 400-500 adet meyve, kaplama ilaçlama için ise 200 adet meyve kontrol edilir ve (%) vuruş oranı saptanır. Yapılan sayımlar sonucunda, salamuralık çeşitlerde %1 vuruş, yağlık çeşitlerde ise %3-4 vuruş saptandığında, yer aletleri ile kısmi dal ilaçlaması veya kaplama ilaçlama yapılmalıdır.

DEKAGARD 5 SC hakkında bir şikayetiniz olması halinde İl/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

DEKAGARD 5 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **DEKAGARD 5 SC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırılarak kullanılmaz.



**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.**

DEKAGARD 5 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	3A	Insektisit (Böcek İlacı)
-------	----	--------------------------

50 g/l Deltamethrin

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FIRMA:

**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.**

Üretim Tesisi: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA
Merkez: Toplarönü Sok. No:16 Anadoluhisarı / İSTANBUL
Tel: (0216) 308 65 87 - 90 **Fax:** (0216) 308 65 84

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER

ve ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Toplarönü Sokak No: 16 34810 Anadoluhisarı

Beykoz / İSTANBUL Yenikapı V.D.: 3070018488

Merkez Tic. Sic. No: 68 - 3 Mersis No: 8307001848800011

Antalya Fab. Tic.Sic.No : 47447-44644 Mersis No : 8307001848800015

Murat BAYSAL
Yurtiçi Satış Müdürü



**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.**

16.05.2026



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : E-81466379-320.04.02-25259662
Konu : DEKAGARD 5 SC HK.

17.06.2026

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİNE
TOPLARÖNÜ SOK.NO.16 BEYKOZ / İSTANBUL

İlgi : a) Doğal Kimyevi Maddeler ve Zırai İlaçlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 22.05.2026 tarihli ve sayılı yazısı.
b) 09.04.2026 tarihli ve E-81466379-320.04.02-24264140 sayılı yazımız.

Firmanız adına ruhsatı bulunan DEKAGARD 5 SC (50 g/l Deltamethrin) isimli bitki koruma ürününe ilgi yazı kapsamında Vişne/Kiraz Sineği tavsiyesi eklenmiş olup son onaylı ürün etiketi yazımız ekinde gönderilmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Bakan a.
Daire Başkanı

EK: ETİKET (2 Sayfa)

