

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 26.09.2019 / 11468

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Armut	Armut karalekesi (<i>Venturia pirina</i>)	30 g/100 L su	7 gün
	Armut memeli pası (<i>Gymnosporangium fuscum</i>)	40 g/100 L su	14 gün
Elma	Elma karalekesi (<i>Venturia inaequalis</i>)	30 g/100 L su	7 gün
	Elma küllemesi (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	40 g/100 L su	14 gün
	Elma depo hastaıkları (<i>Penicillium</i> spp., <i>Botrytis cinerea</i> , <i>Monilinia fructigena</i>)	40 g/100 L su	14 gün
Ayva	Ayva monilyası (Mumya) (<i>Sclerotinia linhartiana</i>)	50 g/100 L su	14 gün
Kayısı	Çiçek monilyası (<i>Monilinia laxa</i> = <i>Sclerotinia laxa</i>)	40 g/100 L su	14 gün
Antepfıstığı	Antepfıstığında karazenk (<i>Pseudocercospora pistacina</i>)	50 g/100 L su	-
Nar	Narda kahverengi leke (<i>Alternaria alternata</i>)	50 g/100 L su	-
Nohut	Nohut antraknozu (<i>Ascochyta rabiei</i>)	50 g/da	10 gün
Şeftali	Çiçek monilyası (<i>Monilinia laxa</i> = <i>Sclerotinia laxa</i>)	40 g/100 L su	14 gün
Nektarin	Çiçek monilyası (<i>Monilinia laxa</i> = <i>Sclerotinia laxa</i>)	40 g/100 L su	14 gün
Kıraz	Çiçek monilyası (<i>Monilinia laxa</i> = <i>Sclerotinia laxa</i>)	40 g/100 L su	7 gün
	Meyve monilyası (Mumya) (<i>Monilinia fructigena</i>)		
Vişne	Çiçek monilyası (<i>Monilinia laxa</i> = <i>Sclerotinia laxa</i>)	40 g/100 L su	7 gün
	Meyve monilyası (Mumya) (<i>Monilinia fructigena</i>)		
Mandarin	Kahverengi leke (<i>Alternaria alternata</i> f.sp.citr)	40 g/100 L su	7 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.**

DORYAT WG

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

Grubu	C2:7	C3:11	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	------	-------	----------------------------

%25,2 Boscalid + %12,8 Pyraclostrobin

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA
KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.
Göz ile teması halinde: Hemen bol su ile yıkayın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin ve tahriş devam ederse tıbbi yardım alın.
Deri ile teması halinde: Su ve sabun ile yıkanıp uzun süre durulmalıdır. Kimyasal bulaşmış elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır. Tekrar kullanmadan önce yıkanmalıdır.
Solunması halinde: Hastayı temiz havaya çıkarın ve sakın bir yerde tutun. Semptomlar gelişir veya devam ederse tıbbi yardım alın.
Yutulması halinde: Ağzınızı çalkalayın. Yarı bilinçli veya bilinçsiz bir kişiye ağızdan bir şey vermeyin. Kusturmaya çalışmayın. Tıbbi yardım alın. Bitki koruma ürününün ambalaj ve etiketini yanınızda götürünüz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114



Net Miktarı:
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Boscalid Teknik, Pyraclostrobin Teknik,
Kalsiyum İznosülfonat, Amonyum sülfat, Sodyum sülfat



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

H315: Cilt tahrişine yol açar.
H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
H400: Sucul ortamda çok toksiktir.
H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
EUH208: Sodyum sülfat içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.
ÖNLEM İFADELERİ:
P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçınınız.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.
P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR:**

- Anılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- Bitki koruma ürününü kendi ambalajında, kapalı, serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.**

Üretim Tesisi: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA
Merkez: Toplarönü Sok. No: 16 Anadoluhisari / İSTANBUL
Tel: (0216) 308 65 87 - 90 Fax: (0216) 308 65 84



Murat BAYKAL
Yurtiçi Satış Müdürü

23 TEMİZLİK 2026

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Armutta karaleke: Birinci uygulama çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce) yapılır. İkinci uygulama beyaz rozet döneminde yapılır. Üçüncü uygulama çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce yapılır. Dördüncü ve diğer uygulamalar kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Armutta memelipas: Birinci uygulama çiçek tomurcukları patlamadan hemen önce yapılır. İkinci uygulama çiçekler beyaz rozet döneminde yapılır. Üçüncü uygulama çiçek taç yapraklarının %80-90'ı döküldüğü zaman yapılmalıdır. Genellikle 3 uygulama yeterli olmakla beraber, ilkbaharın yağışlı geçtiği iklim koşullarında, bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak yağışlar bitinceye kadar diğer uygulamalara devam edilir.

Elmada külleme: Birinci uygulama pembe çiçek tomurcuğu döneminde yapılır. İkinci uygulama çiçek taç yapraklarının %60-70'i döküldüğünde yapılır. Üçüncü ve diğer uygulamalar hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 10 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

Elmada karaleke: Birinci uygulama çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce) yapılır. İkinci uygulama pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde) yapılır. Üçüncü uygulama çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce yapılır. Dördüncü ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Elma depo hastalıkları: Uygulamalar hasattan önce veya hasattan sonra yapılmalıdır. Hasattan önce yapılacak uygulamalarda son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilmelidir.

Ayvada monilya: Uygulamadan önce bir yıl öncesinden ağaç üzerinde asılı kalan mumya meyveler toplanmalıdır. Birinci uygulama çiçeklerin %5'i açtığında yapılır. İkinci uygulama çiçeklerin %50'si açtığında yapılır. Üçüncü uygulama tam çiçeklenme döneminde (çiçeklerin %90-100'ü açtığında) yapılmalıdır.

Kayısı, Şeftali, Nektarin, Kiraz ve Vişnede çiçek monilyası: Birinci uygulama çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte) yapılır. İkinci uygulama tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır.

Kiraz ve Vişnede meyve monilyası: Meyvelere ben düştüğünde tek bir uygulama yapılmalıdır.

Antepfıstığında karazenk: Birinci uygulama koruyucu fungusitlerle mücadele yapılacaksa, uygulamaların mutlaka ilk enfeksiyonlardan önce, yaprakların açılmaya başladığı dönemde; tedavi edici fungusitlerle mücadele yapılacaksa meyveler nohut tanesi iriliğinde ve yaprakların tam olarak açtığı dönemde yapılmalıdır. Ayrıca, tedavi edici fungusitlerle ilk belirtilerin görüldüğü döneme kadar uygulama yapılabilir. İkinci ve diğer uygulamalar kullanılan bitki koruma ürününün özelliği, etki süreleri ve yağış durumu dikkate alınarak yapılır.

Narda kahverengi leke: Birinci uygulama çiçek tomurcukları belirginleşmeye başladığında yapılır. İkinci uygulama taç yapraklar döküldüğünde yapılır. Üçüncü uygulama meyveler yarı büyüklüğe gelince yapılır.

Nohut antraknozu: Uygulamaya günlük ortalama sıcaklığın 10 °C ve orantılı nemin en az %80 olması durumunda başlanması gerekirse de, pratik olarak yörede hastalığın ilk belirtilerinin görülmesi ile başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinliği süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Uygulamanın yapıldığı gün şiddetli yağış olmuşsa uygulama tekrarlanmalıdır.

Mandarinde kahverengi leke: Birinci uygulama sürgünler yaklaşık 5-10 cm uzunluğa ulaştığı ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılır. Kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak meyveler yaklaşık 4 cm çapa ulaşınca kadar uygulamalara devam edilir.

DORYAT WG hakkında bir şikayetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

DORYAT WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C2:7 / C3:11 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **DORYAT WG**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C2:7 / C3:11 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

23 Temmuz 2026

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.

DORYAT WG

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

Grubu	C2:7	C3:11	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	------	-------	----------------------------

%25,2 Boscalid + %12,8 Pyraclostrobin

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER
ve ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Toplantı Sokak No: 16 34310 Anadoluhisar
Beykoz / İSTANBUL Yenikapı V.D.: 3025018909
Merkez Tic. Sic. No: 68 - 8 Mersis No: 0307061890800011
Antalya Fab. Tic. Sic. No: 02447-44644 Mersis No: 0302001890800015

Murat BAYSAL
Yurtiçi Satış Müdürü





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : E-81466379-320.04.02-25923495

28.07.2026

Konu : Tavsiye Ekleme - CORKİ 300 EC, DIREN
50 WP, DORYAT WG

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİNE

Toplarönü Sok. No:16 Beykoz / İSTANBUL

İlgi : a) 21.05.2026 tarihli yazınız.
b) 07.07.2026 tarihli yazınız.
c) 07.07.2026 tarihli yazınız.

Firmanız adına imal ruhsatı buhunan **CORKİ 300 EC, DIREN 50 WP ve DORYAT WG** isimli bitki koruma ürünlerine ait etiketlere ilgede kayıtlı yazılarda talep edilen tavsiyelerin ilave işlemi tamamlanmış olup Genel Müdürlüğümüz onaylı etiket örnekleri ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Bayram KERİMOĞLU
Bakan a.
Daire Başkanı V.

Ek:

- 1 - Etiket - CORKİ 300 EC (2 Sayfa)
- 2 - Etiket - CORKİ 300 EC (2 Sayfa) (Fiziksel Ek)
- 3 - Etiket - DIREN 50 WP (2 Sayfa)
- 4 - Etiket - DIREN 50 WP (2 Sayfa) (Fiziksel Ek)
- 5 - Etiket - DORYAT WG (2 Sayfa)
- 6 - Etiket - DORYAT WG (2 Sayfa) (Fiziksel Ek)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: A9F21DDC-E18A-470D-80EF-F9F5066D6599
Eskişehir Yolu 9. Km. İçişleri Bakanlığı 06800 Çankaya/ANKARA
KEP Adresi : tarimveormanbaknligi@hs01.kep.tr

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Bilgi için: İsmihan DEMİRAY

AĞALAR

Mühendis

Telefon No:(312) 258 75 60

