

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 06.05.2005 / 5096

ÜRÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİLER:

Bitki Adı	Uygulama Amacı ve Dönemi	Uygulama Dozu
Sofralık çekirdeksiz üzümde	Birinci uygulama çiçeklenmeden önce salkımlar 4-8 cm boyda iken, salkımların boyunu uzatmak amacıyla uygulanır. İkinci uygulama tam çiçeklenme döneminde yani çiçek taç yapraklarının %70-80'inin döküldüğü devrede, dane seyreltmesi amacıyla uygulanır. Üçüncü uygulama çiçeklenmeden sonra dane 3 mm saçma iriliğine ulaştığında, dane inleştirmesi amacıyla uygulanır.	2 tablet/100 L su
Kurutmalık çekirdeksiz üzümde	Çiçek kapsüllerinin dökülmesinden 4-5 gün sonra verimi artırmak amacıyla uygulanır.	1 tablet/100 L su
Mandarinlerde	Salsuma ve Klemantin çeşitlerinde çiçek dökümünü azaltmak, meyve tutumunu artırmak ve verim artışı sağlamak amacıyla çiçeklerin %75-80'inin açtığı devrede uygulanır.	1,5 tablet/100 L su
Portakallarda	Yafa portakallarında Haziran dökümünü önlemek için, çiçek açımının tamamlanmasından 4-5 hafta sonra uygulanır.	2 tablet/100 L su
	Washington Navel çeşidinde meyvelerin ağaçta kalma sürelerini uzatmak ve hasadı düzenlemek amacıyla meyvelerde renk değişiminin başladığı devrede uygulanır.	1-2 tablet/100 L su
Limonlarda	Meyvelerde ilk renk değişimi görüldüğünde, meyvelerin ağaçta 2-3 ay kalmalarını sağlamak amacıyla uygulanır.	1 tablet/100 L su
Greyfurtlarda	Meyve kabuğunda çürüme, bozulma ve yumuşama olmadan hasadı geciktirmek amacıyla meyvelerde ilk renk değişiminin görüldüğü devrede uygulanır.	1 tablet/100 L su
Armutlarda	Meyve tutumu az olan armut çeşitlerinde verimi artırmak için çiçeklerinin %30'unun açtığı devrede uygulanır.	1,5-2 tablet/100 L su
	Ayrıca çiçeklenme zamanında meydana gelen don olaylarından sonra partenokarp meyve oluşumunu sağlamak için donlardan en geç 2 gün sonra uygulanır.	0,5-2 tablet/100 L su
Kiraz ve Vişnelerde	Hasadı geciktirmek, iri ve parlak renkli tane elde etmek amacıyla renk değişiminin başladığı dönemde uygulanır.	1-2 tablet/100 L su
Şeftalilerde	Ağustos ayının ilk haftasında yapılacak uygulamaya bir sonraki yıl çiçek açımını 3-7 gün geciktirmekte ve şeftallerin ilkbaharın geç donlarından zarar görmesini engellemektedir.	1,5 tablet/100 L su
Çileklerde	Anaç bitki 1-6 yapraklı iken, fideleklerde anaç bitkinin verdiği genç sürgünlerin çoğaltması için kullanılır. Ayrıca çileklerde mahsule yatmayı sağlamak, verimi artırmak ve meyveleri inleştirmek için çiçeklenmeden 3-4 hafta önce uygulanır.	5 tablet/100 L su
Enginarlarda	Hasadı 1-2 ay erkene almak, düzgün şekilli ve iri ürün elde etmek amacıyla bitkilerin 4-5 yapraklı ve yaprak boylarının 20-30 cm olduğu devrede özellikle bitkilerin göbek kısmına uygulanır.	2,5-5 tablet/100 L su
Patateslerde	Tohumluk patatesler dikilmeden önce MEGAFILL TABLET ile hazırlanan solüsyona daldırılır ve dikilir, böylece hızlı ve düzenli çıkış sağlanır.	2 tablet/100 L su
Marullarda	Göbek bağlamayı teşvik etmek için hasattan 7-15 gün önce uygulanır.	1-2 tablet/100 L su
Biberlerde	Verimi artırmak için çiçeklerin yarısı meyve tuttuğunda ve bundan 2-3 hafta sonra uygulanır.	3 tablet/100 L su
Süs bitkilerinde	Kesme çiçekçilikte uzun sap ve iri çiçek elde etmek için krizantem, gül, siklamen ve karanfilde kullanılır.	4-15 tablet/100 L su
Buğday	Verimi artırmak için buğdayın sapa kalkma dönemine kadar uygulanır.	1 tablet/da
Domates (Sera)	Verimi artırmak için; birinci uygulama çiçeklerin %50 meyve tuttuğunda, ikinci uygulama birinci uygulamadan 20 gün sonra yapılmalıdır.	3 tablet/100 L su
Mısır	Verimi artırmak için mısır bitkisinin 2-6 yapraklı olduğu dönemde uygulanır.	1 tablet/da

SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE SIFIR GÜNDÜR.

ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan tablet önce ayrı bir kapta bir miktar suda eritilir. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanınca kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.



DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A. Ş.

MEGAFILL TABLET

Tablet (TB)

Grubu	-	Bitki Gelişim Düzenleyicisi
-------	---	-----------------------------

1 g Gibberellic acid/1 tablet

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Ürünün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Ürün uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNEMLERİ:

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.
Göz ile teması halinde: Yanma geçinceye kadar temiz su ile yıkanmalıdır.
Deri ile teması halinde: Uzun süreli temaslarda, su ve sabun ile yıkanıp uzun süre durulanmalıdır. Kimyasal bulaşmış elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır.
Solunması halinde: Derhal temiz havaya çıkarılmalı, solunum durmuş ise suni teneffüs yaptırılmalıdır. Solunum zor ise oksijen verin. Doktora başvurun.
Yutulması halinde: Şuuru yerinde olmayana kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin. Acilen doktor çağırın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114



14 Kasım 2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARŞILAMA BÖLÜMÜ

Net Miktarı:
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Gibberellik asit, Sodyum bikarbonat, Adipik asit



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

ÖNLEM İFADELERİ:

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Anılara zehirlidir.
- Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
- Tavsiyelere uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.
- Ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Greyfurt dışındaki kökür bitkilerinde iyonik olmayan bir yayıcı yapıştırıcı ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.
- Suda kolayca hidrolize olduğundan hazırlanan solüsyon bekletilmeden kullanılmalıdır.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoggörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A. Ş.

Üretim Teslim: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA

Merkez: Toplarönü Sok. No: 16 Anadoluhisarı / İSTANBUL
Tel: (0216) 308 65 87 - 90 Fax: (0216) 308 65 84

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER

ve ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Toplarönü Sok. No: 16 Anadoluhisarı / İSTANBUL
Bilgiye Tık Şişli
Ankara Fabrikası
Ankara 2. Fabrika
Ankara 3. Fabrika
Gölcük Fabrikası
Tic. Sic. No: 276710
Mersis No: 0302001890000011
Mersis No: 0302001890000015
Mersis No: 0302001890000012
Mersis No: 0302001890000013
Mersis No: 0302001890000014

Mehmet Murat TÜRKMEÑOĞLU

Geliştirme ve Teknik Tanıttımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü



Sayı : E-81466379-320.04.02[320.04.02]-16768174

21.11.2024

Konu : MEGAFIL TABLET - Tavsiye(Mısır)

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİNE
TOPLARÖNÜ SOK.NO.16 BEYKOZ / İSTANBUL

Firmanız adına ruhsatlı bulunan MEGAFIL TABLET isimli bitki koruma ürününüz için mısırdaki 1 tablet/da dozunda tavsiye işleminiz tamamlanmış olup Genel Müdürlüğünüzce onaylanan etiket yazınızı ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Bakan a.
Daire Başkanı

Ek: Etiket (1 Sayfa)

Doğrulama Kodu: 4680B593-702E-4755-B899-554A79852212
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevki 06800 Çankaya/ Ankara
Tel: (0312) 287 33 60 Faks:
KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Bilgi için: Zeynep ÇINAR
Mühendis

