

İmal Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj Numarası:  
Ruhsat Tarih ve Numarası: 16.03.2012 / 8613

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:**

| Bitki Adı              | Zararlı Organizma Adı  | Uygulama Dozu ve Dönemi                  | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
|------------------------|--|--|--|
| Elma                   | Avrupa kırmızıörümceği<br>( <i>Panonychus ulmi</i> )         | 25 ml/100 L su<br>(yumurta, larva, nimf) | 14 gün                                 |
| Domates                | İki noktalı kırmızıörümcek<br>( <i>Tetranychus urticae</i> ) | 35 ml/100 L su<br>(larva, nimf)          | 3 gün                                  |
| Pamuk                  | İki noktalı kırmızıörümcek<br>( <i>Tetranychus urticae</i> ) | 25 ml/da<br>(yumurta, larva, nimf)       | 21 gün                                 |
|                        | Kırmızı örümcek<br>( <i>Tetranychus cinnabarinus</i> )       | 50 ml/da<br>(yumurta, larva, nimf)       |  |
| Karpuz                 | İki noktalı kırmızıörümcek<br>( <i>Tetranychus urticae</i> ) | 25 ml/da<br>(larva, nimf)                | 3 gün                                  |
| Bağ *                  | İki noktalı kırmızıörümcek<br>( <i>Tetranychus urticae</i> ) | 25 ml/100 L su<br>(yumurta, larva, nimf) | 7 gün                                  |
| Biber<br>(Sera)        | İki noktalı kırmızıörümcek<br>( <i>Tetranychus urticae</i> ) | 35 ml/100 L su<br>(larva, nimf)          | 3 gün                                  |
| Çilek<br>(Tarla)       | İki noktalı kırmızıörümcek<br>( <i>Tetranychus urticae</i> ) | 35 ml/100 L su<br>(larva, nimf)          | 1 gün                                  |
| Hıyar<br>(Tarla, Sera) | İki noktalı kırmızıörümcek<br>( <i>Tetranychus urticae</i> ) | 35 ml/100 L su<br>(larva, nimf)          | 3 gün                                  |
| Turunçgil **           | Turunçgil kırmızıörümceği<br>( <i>Panonychus citri</i> )     | 25 ml/100 L su<br>(yumurta, larva, nimf) | 21 gün                                 |

\* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.  
\*\* Turunçgilde faydalılara karşı zararsız olduğu tespit edilmiştir.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:**

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

**KALİBRASYON:**

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:**

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:**

**Elma - Avrupa kırmızıörümceği:** Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

**Domates, Hıyar ve Biber - Kırmızıörümcekler:** Domates ve hıyarda yaprak başına ortalama 3-5 adet, biberde 1-3 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.



**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR  
SAN. VE TİC. A. Ş.**

**TAZOLE**

**Süspansiyon Konsantre (SC)**

|       |     |                                    |
|-------|-----|------------------------------------|
| Grubu | 10B | Akarisit<br>(Kırmızıörümcek İlacı) |
|-------|-----|------------------------------------|

**110 g/L Etozazole**

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:**

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.

**Göz ile teması halinde:** Yanma geçinceye kadar temiz su ile yıkanmalıdır. **Deri ile teması halinde:** Uzun süreli temaslarda, su ve sabun ile yıkanıp uzun süre durulanmalıdır. Kimyasal bulaşmış elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır.

**Solunması halinde:** Derhal temiz havaya çıkarılmalı, bilinci yerinde değilse hastayı yan pozisyonda yatırın.

**Yutulması halinde:** Şuuru yerinde olmayana kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin. Acilen tıbbi yardım alın.

**ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:**

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme halinde semptomatik tedavi uygulanır.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114**

Net Miktarı:  
Azami Per. Sat. Fiyatı:

**İÇİNDEKİLER:** Etozazole, Mono propilen glikol



**DİKKAT**

**ZARARLILIK İFADELERİ:**

- H319:** Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H410:** Suçul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
- ÖNLEM İFADELERİ:**
- P280:** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
- P501:** İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.
- EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- Bitki koruma ürününü serin, kuru ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
- Tavsiyelere uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.

**DİKKAT: Kullanmadan önce iyice çalkalayınız!**

**DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI:**

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

**RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:**

**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR  
SAN. VE TİC. A. Ş.**

**Üretim Tesisi:** Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA  
**Merkez:** Toplarönü Sok. No: 16 Anadoluhisarı / İSTANBUL  
**Tel:** (0216) 308 65 87 - 90 Fax: (0216) 308 65 84

**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER  
ve ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A. Ş.**  
Ticaret Sic. No: 271140 / Mersis No: 0802001800000011  
Merkez Tic. Sic. No: 271140 / Mersis No: 0802001800000011  
Antalya Fabrikası Tic. Sic. No: 271140 / Mersis No: 0802001800000011  
Antalya 2 Şube Tic. Sic. No: 271140 / Mersis No: 0802001800000011  
Antalya 3 Şube Tic. Sic. No: 271140 / Mersis No: 0802001800000011  
Gebze Şubesi Tic. Sic. No: 271140 / Mersis No: 0802001800000011

**Mehmet Murat TÜRKMEÑOĞLU**  
İş Geliştirme ve Teknik Tanıttımdan  
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



**19 Ağustos 2021**  
**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**  
**GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**KABUL EDİLMİŞTİR.**

**Pamuk - Kırmızıörümcekler:** Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararlı yalnız tarla kenarında ya da içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlar uygulanmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesinde 5 adet, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 10 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

**Karpuz - İki noktalı kırmızıörümcek:** Sebze bahçelerinde ilk sayım için çiçeklenme döneminde araziye parsellerin köşegenlerinden çapraz olarak girilir. 3-5 adımda bir, bitkinin dip ve orta yapraklarında kırmızıörümcek nimf ve erginlerinin sayımı yapılır. Yapraklar üzerindeki canlı kırmızıörümcekler büyüteç ile sayılıp kayıt edilir. Toplam kırmızıörümcek sayısı sayılan yaprak adetine bölünür. Bir yaprağa düşen canlı kırmızıörümcek sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 5 adet canlı kırmızıörümcek bulunduğu müdahaleye karar verilir.

**Bağ - İki noktalı kırmızıörümcek:** Yayılış gösterdiği bağ alanları gözlem altında tutulmalı, bir yaprakta 5-8 adet zararlı bulunduğu kimyasal mücadele önerilir. Birinci uygulamada kullanılan ürünün etki süresi bitiminden itibaren yapılan sayımlarda, zararlı yoğunluğu eşğin üzerine çıkarsa ikinci uygulama yapılır. Hasattan önce yapılan uygulamalarda, kullanılan akarisitın bekleme süresi dikkate alınarak uygulamaya son verilir. Şayet zarar devam ediyorsa hasattan sonra da uygulama yapılabilir.

**Çilek - İki noktalı kırmızıörümcek:**

**Erken dönem uygulaması:** Kırmızıörümceklerin her yıl sorun olduğu çilek alanlarında çiçek ve yeşil meyve döneminde (ilk olgun meyveler görülmeden önce) kırmızıörümcekler görüldüğünde bir uygulama yapılmalıdır. Erken dönem uygulaması meyvelerde kalıntı bırakmaması için daha güvenlidir.

**Mevsim içi uygulaması:** Erken dönem uygulamasının yapılmadığı durumlarda, açıkta yetiştirilen çilekler mevsim başında (Mart sonu - Nisan başı) 3-5 gün aralıklarla kontrol edilir. Kırmızıörümcekler çilekte mevsim başında çevredeki bitkilerde görülür. Öncelikle bu bitkilerin kontrol edilmesi ve uygulanması yeterlidir. Popülasyonun yaygınlık göstermesi durumunda tarlayı temsil edecek şekilde bitkinin orta ve alt bölümlerinde en az 50 yaprakçık incelenir. Yaprakçık başına 15 ve üzerinde kırmızıörümcek tespit edilmesi halinde uygulamaya karar verilir. Meyve toplanmasından hemen sonra uygulama yapılır. Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek hasat yapılmalıdır.

**Turuncgil - Turuncgil kırmızıörümceği:** 10 yaprakta yapılacak sayımlarda 9 ve üzeri canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Uygulamalar çiçeklenmeden önce yapılmalı, bu dönem geçirilmiş ise meyve bağladıktan bir hafta sonra yapılmalıdır.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:**

**TAZOLE** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 10B olarak sınıflandırılmış bir akarisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **TAZOLE**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 10B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU:**

Alkali özellikteki ürünler ile karıştırmayınız. Diğer ürünler ile karıştırılmadan önce mutlaka ön karışım testi yapılmalıdır.



**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR  
SAN. VE TİC. A. Ş.**

**TAZOLE**

**Süspansiyon Konsantre (SC)**

|       |     |                                    |
|-------|-----|------------------------------------|
| Grubu | 10B | Akarisit<br>(Kırmızıörümcek İlacı) |
|-------|-----|------------------------------------|

**110 g/L Etoxazole**

**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER**

**ve ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİCARET A.Ş.**

Teşvikiye Sok. No: 16 Kat: 11/11 - Anadolu İşhanı - 06100/Beştepe - Ankara - V.D. - 30200180011

Merkez Tic. Sic. No: 270900 - Mersis No: 030200180000011

Antalya Fabrika - Tic. Sic. No: 270900 - Mersis No: 030200180000015

Antalya 2 Şube - Tic. Sic. No: 270900 - Mersis No: 030200180000012

Antalya 3 Şube - Tic. Sic. No: 270900 - Mersis No: 030200180000013

Gebze Şube - Tic. Sic. No: 270900 - Mersis No: 030200180000014

**Mehmet Murat TÜRK MENOĞLU**

İş Geliştirme ve Teknik Tanıtımdan  
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

**19 Ağustos 2021**  
**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**  
**GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**KABUL EDİLMİŞTİR.**



*(Handwritten signature)*