

[illegible]

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elmada karaleke: Birinci uygulama çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce) yapılır. İkinci uygulama pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde) yapılır. Üçüncü uygulama çiçek taç yaprakları %70-80 döküldüğünde yapılır. Dördüncü ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Armutta karaleke: Birinci uygulama çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce) yapılır. İkinci uygulama beyaz rozet döneminde yapılır. Üçüncü uygulama çiçek taç yaprakları %70-80 döküldüğünde yapılır. Dördüncü ve diğer uygulamalar kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Armutta memelipas: Birinci uygulama çiçek tomurcuqları patlamadan hemen önce yapılır. İkinci uygulama çiçekler beyaz rozet döneminde yapılır. Üçüncü uygulama çiçek taç yapraklarının %80-90'ı döküldüğü zaman yapılır. Genellikle 3 uygulama yeterli olmakla beraber, ilkbaharın yağışlı geçtiği iklim koşullarında, bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak yağışlar bitinceye kadar diğer uygulamalara devam edilir.

Ayvada monilya: Uygulamadan önce bir yıl öncesinden ağaç üzerinde asılı kalan mumya meyveler toplanmalıdır. Birinci uygulama çiçeklerin %5'i açtığında yapılır. İkinci uygulama çiçeklerin %50'si açtığında yapılır. Üçüncü uygulama tam çiçeklenme döneminde (çiçeklerin %90-100'ü açtığında) yapılmalıdır.

Bağda külleme: Birinci uygulama çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde yapılır. İkinci uygulama çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuqlarının ayrıldığı dönemde yapılır. Üçüncü uygulama çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde yapılır. Dördüncü ve diğer uygulamalar üçüncü uygulamadan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Kayısı ve Kiraz sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası: Birinci uygulama çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte) yapılır. İkinci uygulama tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır.

Kirazda meyve monilyası: Ben düşme döneminde tek bir uygulama yapılır. Uygulama ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır.

Şeftalide külleme: Birinci uygulama önceki yıllardaki hastalığın yoğunluğuna göre belirlenmelidir. Hastalık bahçede ilk defa çıkıyorsa belirtiler görülür görülmez uygulamaya başlanmalıdır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise budamadan sonra yapılacak kontrollerde, ağaçlardaki hastalıklı sürgün oranı %3'ü buluyorsa belirtiler görülmeden önce (yani önceki yıllarda hastalığın görüldüğü tarihten en az 5-8 gün önce veya sürgünler 20 cm olursa) ilk uygulama yapılmalıdır. İkinci ve diğer uygulamalar bitkinin gelişmesi ve uygulanan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 14 gün aralıklarla yapılır.

Domates (Sera), Biber ve Patlıcan patlıcangillerde külleme: Uygulamalar ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Hastalık ve iklim koşullarının seyrine göre 10 gün ara ile uygulama tekrarlanır. Domates (Sera) patlıcangillerde küllemeyle karşı en fazla 4 uygulama yapılmalıdır.

Hiyar (Sera), Kabak (Sera), Kavun ve Karpuz kabakgillerde külleme: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etki süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 °C'nin üstünde ve orantılı nemin de %50'nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

Fındıkta külleme: Hastalık bahçede ilk defa görülüyorsa belirtiler görülür görülmez uygulamaya başlanır. daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise meyve (çotanak) bağlama döneminde uygulamaya başlanır. İlk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Hastalık ve iklim koşullarının seyrine göre 12-14 gün ara ile uygulama tekrarlanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

YARDA 400 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C2:7 / G1:3 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **YARDA 400 SC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C2:7 / G1:3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Organik fosforlu insektisitler ile karıştırmayınız. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırarak kullanılması tavsiye edilmez.



**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.**

YARDA 400 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	C2:7	G1:3	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	------	------	----------------------------

200 g/L Fluopyram + 200 g/L Tebuconazole

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER

ve ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş.

İstanbul: 8 Sok. No: 38/1 Şişli/Beşiktaş/İstanbul Tel: 0212 307 00 00
Müşteri Hizmetleri: 0212 307 00 01
Ardahan: 0307 200 00 00
Antalya: 0307 200 00 00
Bursa: 0307 200 00 00
Eskişehir: 0307 200 00 00
Gaziantep: 0307 200 00 00
İzmir: 0307 200 00 00
Konya: 0307 200 00 00
Manisa: 0307 200 00 00
Mardin: 0307 200 00 00
Mersin: 0307 200 00 00
Muğla: 0307 200 00 00
Nizip: 0307 200 00 00
Osmaniye: 0307 200 00 00
Rize: 0307 200 00 00
Samsun: 0307 200 00 00
Sivas: 0307 200 00 00
Tunceli: 0307 200 00 00
Van: 0307 200 00 00
Yozgat: 0307 200 00 00

Mehmet Murat TÜRKMEÑOĞLU
İş Geliştirme ve Teknik Tanımdan
Sorumlu Yürütücü Kurulu Üyesi

