

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No.su: 27.07.2006 / 5591

ÜRÜNÜN KULLANILACAKI BİTKİLER:

Bitki Adı	Uygulama Amacı ve Dönemi	Uygulama Dozu (100 l suya)
ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM	Salkım ve taneleri irileştirmek amacıyla kullanılır.	
Sofralıklarda	1. uygulama çiçek kapsüllerinin % 70 döküldüğü devrede yapılır. 2. uygulama ilk uygulamadan 10-12 gün sonra tanelerin 3 mm çapında, saçma iriliğine ulaştığı devrede yapılır.	64 g 64 g
Kurutmalıklarda	Çiçek kapsüllerinin dökülmesinden birkaç gün sonra kullanılır.	16 g
Mandarinlerde	Özellikle Satsuma ve Klemantin türü mandarinlerde çiçeklerin % 75-80 açtığı devrede döllenmeyi teşvik için kullanılır.	48 g
Portakallarda	Valencia portakalları hariç diğer çeşitlerde çiçek açımının tamamlanmasından 4-5 hafta sonra kullanılır.	64 g
Washington portakallarda	Hasadın geciktirilmesi için meyvelerde ilk renk değişimi görüldüğünde kullanılır.	32 g
Yataklı limonlarda	Hasadın geciktirilmesi için meyvelerde yeşilden sarıya ilk renk dönüşümü görüldüğünde kullanılır. Bu durumda meyveler 2-3 ay süreyle ağaç üzerinde kalabilir.	32 g
Greyfurtlarda	Hasadın geciktirilmesi için ilk renk dönüşümü görüldüğünde kullanılır. Bu durumda meyveler 2-3 ay süreyle ağaç üzerinde kalabilir.	48 g
Armut	Döllenmesi zayıf, meyve tutumunun az olduğu armut çeşitlerinde çiçeklerin % 30'unun açtığı devrede verim artışı sağlamak için ve çiçeklenme döneminde meydana gelebilecek don zararından korunmak için donlardan en geç 2 gün sonra kullanılır.	48-80 g
Şeftali	Ağustos ayının ilk haftasında, özellikle Dixired ve Hale çeşitlerinde kullanılır. MEGAFILL SP ile hazırlanan solüsyon püskürtülürse ağaçlar geç donlardan korunmuş olur ve meyve seyreltme işi kendiliğinden gerçekleşmiş olur.	32-48 g
Çilek	Mahsule yatmayı sağlamak ve meyveleri irileştirmek amacıyla çiçeklenmeden 3-4 hafta önce kullanılır.	48-80 g
Enginar	Turfanda enginar yetiştirmek, düzgün şekilli ve iri mahsul elde etmek için yaprak boyları 25-30 cm olduğu devrede hazırlanan solüsyon tüm bitkiye özellikle de bitkilerin göbek kısımlarına püskürtülür.	80-160 g
Kiraz	Dayanıklı, düzgün ve iri meyve için meyvelerde renk değişiminin başladığı devrede kullanılır.	48-80 g
Patates	Tohumluk olarak kullanılacak patatesler MEGAFILL SP solüsyonuna dikimden önce bandırlarak dikilir. Çimlenme hızlanır. Çıkış düzgün olur.	16 g
Marul ve Kıvrıkcık salata	Verim artışı için fideler bahçeye şaşırtıldıktan bir hafta sonra uygulanır.	80-160 g

MEGAFILL SP UYGULAMASINDA YAYICI YAPIŞTIRICI KULLANILMASI ÖZELLİKLE TAVSİYE EDİLİR.

ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ürün önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Alkali özellikteki ve klor içeren solüsyonlar hariç diğer fungusit, insektisit ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.



**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.**

MEGAFILL SP

Suda Çözünen Toz (SP)

Grubu	-	Bitki Gelişim Düzenleyicisi
		% 3,1 Gibberellic acid

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Ürünün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Ürün uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA
KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.

Göz ile teması halinde: Yanma geçinceye kadar temiz su ile yıkanmalıdır.

Deri ile teması halinde: Uzun süreli temaslarda, su ve sabun ile yıkanıp uzun süre durulanmalıdır. Kimyasal bulaşmış elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır.

Soluması halinde: Derhal temiz havaya çıkarılmalı, solumun durmuş ise suni teneffüs yaptırılmalıdır. Solumun zor ise oksijen verin. Doktora başvurun.

Yutulması halinde: Şuuru yerinde olmayana kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin. Acilen doktor çağırın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114



14 Aralık 2017

Net Miktar:
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Gibberellic acid, Potasyum sülfat



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

ÖNLEM İFADELERİ:

P264: Elleçlemeden sonra bol su ile iyice yıkayın.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Anılara zehirlidir. Çiçeklenme dönemi kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
- Tavsiyelere uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.
- Ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız, usulüne uygun imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.**

Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA

Merkez: Toprakrönü Sok. No:16 Anadoluhisari / İSTANBUL

Tel: (0216) 308 65 87 - 90 **Fax:** (0216) 308 65 84

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER

ve ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Toprakrönü Sok. No:16 34610 Anadoluhisari Beykoz/İSTANBUL

A.Kurumlar V.D: 30.0013808 M. Tic. Sic. No: 68-Kadıköy

Antalya Şube T. Tic. Sic. No: 2447 - 44644 Antalya

Mersis No: 08.302.0188.00011

Antalya Şube Sic. No: 28.04.5356.0211

Uğur Taşkan
Ziraat Mühendisi
Ruhsatlandırma