

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 30.09.2022 / 12530

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu
Bağ	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	30 g/100 L su
Domates (Sera)	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	25 g/100 L su
Hıyar (Sera)	Sebzelerde beyaz çürüklük (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	25 g/100 L su

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağ kurşuni küf:
Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde; Birinci uygulama tanelerin olgunluk başlangıcında, ikinci ve diğer uygulamalar kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 7 gün ara ile yapılmalıdır.

Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgelerinde;

Birinci uygulama çiçeklenmeden hemen önce, ikinci uygulama kapalı salıkım döneminde, üçüncü ve diğer uygulamalar kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 7 gün ara ile yapılmalıdır.

Domateste kurşuni küf: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme döneminde iken uygulamaya başlanmalıdır.

Hıyar (Sera) sebzelerde beyaz çürüklük: Bitkinin hastalığa en hassas olduğu kotiledon yaprak döneminden itibaren başlanarak 10 gün ara ile hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak 3-4 uygulama yapılması tavsiye edilir.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Tek başına kullanılması gerekmektedir. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması önerilmez.



**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.**

POLYDOCTOR®

Suda Islanabilir Toz (WP)

Grubu	-	Biyolojik Fungisit (Mantar İlacı)
-------	---	--------------------------------------

Pythium oligandrum strain M1, 1x10⁶ oospor/1 gr

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA
KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.
Göz ile teması halinde: Yanma geçinceye kadar temiz su ile yıkanmalıdır.
Deri ile teması halinde: Su ve sabun ile yıkayıp uzun süre durulanmalıdır. Kimyasal bulaşmış elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır.
Solunması halinde: Hastayı temiz havaya çıkarın ve sakin bir yerde tutun.
Yutulması halinde: Doktor çağırın. Bitki koruma ürününün ambalaj ve etiketini yanınızda götürün.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

Net Miktarı:
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Pythium oligandrum M1

ZARARLILIK İFADELERİ:

Sınıflandırılmamıştır.
ÖNLEM İFADELERİ:
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üzü koruyucu kullanın.
P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıklara zehirlidir. Yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.
- Ambalajı direkt gün ışığından koruyunuz. Donmaya karşı korunaklı şekilde depolayınız. 40°C'nin üstündeki sıcaklıklarda depolanması tavsiye edilmez.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

ÜRETİCİ FİRMA:

BIOPREPARÁTY SPOL. S R.O.
Tyllšovska 772/1, 160 00 Praha 6 Dejvice, Çek Cumhuriyeti

ÜRETİM YERİ:

BIOPREPARÁTY SPOL. S R.O.
Tyršova 180, 439 01 Černčice, Çek Cumhuriyeti

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.**
Merkez: Toplarönu Sok. No: 16 Anadoluhisari / İSTANBUL
Tel: (0216) 308 65 87 - 90 Fax: (0216) 308 65 84

**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER
ve ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**

Toplarönu Sok. No: 16 Anadoluhisari Bağcaüstü Yolu No: 3020010000
Merkez Tic. Sic. No: 48-8 Mersis No: 030200180000011
Anadoluhisari Tic. Sic. No: 42447 Mersis No: 030200180000015
Anadoluhisari 2. Şube Tic. Sic. No: 100272 Mersis No: 030200180000012
Anadoluhisari 3. Şube Tic. Sic. No: 100938 Mersis No: 030200180000013
Bağcaüstü Tic. Sic. No: 28710 Mersis No: 030200180000014



07 Kasım 2024
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞ TİR.

Zülal TÜRKMEN
Ruhsatlandırma Müdürü
Registration Manager