

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 16-10-2025 / 13878

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Hıyar (Sera)	Yaprak galeri sinekleri (<i>Liriomyza trifolii</i> , <i>Liriomyza bryoniae</i> , <i>Liriomyza huidobrensis</i>) Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	50 ml/da (damla sulama ile)	1 gün
Kornişon (Sera)	Yaprak galeri sinekleri (<i>Liriomyza trifolii</i> , <i>Liriomyza bryoniae</i> , <i>Liriomyza huidobrensis</i>) Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	50 ml/da (damla sulama ile)	1 gün
Biber (Sera)	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>) Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	35 ml/da (damla sulama ile) 50 ml/da (damla sulama ile)	3 gün
Biber (Tarla)	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	35 ml/da (damla sulama ile)	3 gün
Domates (Sera)	Domates güvesi (<i>Tuta absoluta</i>) Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera litoralis</i>) Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>) Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	35 ml/da (damla sulama ile) 35 ml/da (damla sulama ile) 35 ml/da (damla sulama ile) 50 ml/da (damla sulama ile)	3 gün
Domates (Tarla)	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	35 ml/da (damla sulama ile)	3 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünün önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün-içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇ NORMU:

Domates (sera) Tütün beyazsineği mücadelesinde ilaç normu aralığı 50-100 l/da olarak tavsiye edilmektedir.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.
ALISTER 200 SC
Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	28	Insektisit (Böcek İlacı)
-------	----	--------------------------

200 g/L Cyantraniliprole

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya ürün bitki üzerinde kuruduktan sonra girilmesinde sakınca yoktur.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.
Göz ile teması halinde: Yanma geçinceye kadar temiz su ile yıkanmalıdır.
Deri ile teması halinde: Su ve sabun ile yıkayıp uzun süre durulanmalıdır.
Kimyasal bulaşmış elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır.
Solunması halinde: Hastayı temiz havaya çıkarın ve sakin bir yerde tutun.
Yutulması halinde: Doktor çağırın. Bitki koruma ürününün ambalaj ve etiketini yanınızda götürünüz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

Net Miktarı:
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Cyantraniliprole, Emülgatör 8 FLN, Emülgatör 8 FL, Stiren Bağlayıcı



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

ÖNLEM İFADELERİ:

P273: Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P264 + P280: Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayınız.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üzü koruyucu kullanınız.

P391: Döküntüleri toplayınız.

P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız.
- Bitki koruma ürününü kendi ambalajlarında kapalı olarak, kuru ve serin yerde saklayınız.
- İpek böceklerine zehirlidir. İpek böceği üretimi yapılan yerlere ve dut ağaçlarına rüzgarla taşınmasına engel olunuz. Çevrede yararlı böceklerin bulunması durumunda dikkatli kullanılmalıdır.

DİKKAT: Kullanmadan önce iyice çalkalayınız!

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER
ve ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Toplantı Sokak No: 16 34810 Arslanbeyli/İstanbul
Büyükdere / İSTANBUL Telefon: +90 212 293 18 00
Merkez Tic. Sic. No: 44 - 8 Mersis No: 0327001500000011
Antalya Fab. Tic. Sic. No: 42447 Mersis No: 0307001500000015

Zülal TÜRKMEN
Ruhsatlandırma Müdürü
Registration Manager

16 Ekim 2025

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Hıyarda (Sera) ve Kornişonda (Sera) yaprak galeri sineklerine karşı: Serada yaprak galeri sinekleri erginlerinin çıkışını belirlemek amacıyla dekara 1 adet olmak üzere sarı yapışkan tuzak bitkinin 10-15 cm yukarısına asılır. Erginler tuzakta görüldüğü zaman örnekleme yapılır. Bir dekarlık alanda en az 30 bitki seçilir. Bu bitkilerin alt, orta ve üst yaprakları toplanarak sayım yapılır. Sayımda küçük yapraklı bitkilerde yaprak başına 4, büyük yapraklı bitkilerde yaprak başına 10 larva tespit edilirse ilaçlamaya karar verilir.

Biberde (Tarla-Sera) ve Domateste (Tarla-Sera) yeşil kurta karşı: Alana köşegenler yönünden girilip, alanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5'1 bulaşık bulunursa derhal mücadeleye geçilir. İlaçlamadan 10 gün sonra alanlar kontrol edilir, ilaçlamayı gerektirecek yoğunluk varsa ilaçlama tekrarlanır.

Biberde (Sera), Hıyarda (Sera), Kornişonda (Sera) ve Domateste (Sera) tütün beyazsineğine karşı: Beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda ilaçlamaya başlanır. Popülasyonun devam etmesi durumunda 10 gün arayla ikinci uygulama yapılır.

Domateste (Sera) domates güvesine karşı: Ergin çıkışını saptamak için üretim sezonunun başlangıcından itibaren tarlada (1-2 tuzak/ha) ve serada (1 tuzak/sera) eşeyssel çekici tuzaklar kullanılır. Tuzaklar haftada bir kontrol edilir. Tuzakta ilk ergin görüldüğünde üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 3'ü bulaşık ise mücadeleye karar verilir. Uygulamadan 5-6 gün sonra bitkiler tekrar kontrol edilir. Gerekirse uygulama tekrarlanabilir.

Domateste (Sera) pamuk yaprak kurduna karşı: Uygulama 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde yapılmalıdır. Larvalar yaprak üzerine dağılmadan uygulama yapılmalıdır. Survey 10-12 gün aralıklarla tekrarlanmalıdır. Eşiğin üzerinde bir zararlı popülasyonu görülmesi halinde ilaçlamalar tekrarlanmalıdır.

Bir sezonda aynı serada 4'ten fazla, aynı tarlada 2'den fazla **ALISTER 200 SC** uygulaması yapmayınız. Bu etiketteki "direnc ile ilgili bilgi" kısmında yer alan diğer kurallara da uyunuz.

Kısıtlamalar: Sebze fideliklerinde uygulama yapmayınız. Stres altındaki bitkilere uygulama yapmayınız.

İlacı hazırlamadan önce damla sulama sistemlerinin temiz olduğundan ve bir önceki uygulamadan ilaç kalıntısı kalmadığından emin olunuz. İlaçlama aletinin deposunu yarıya kadar su ile doldurunuz. Gerekli miktardaki **ALISTER 200 SC**'yi doğrudan ilaçlama aletinin deposuna koyun. İlaç tamamen çözünene kadar karıştırınız. İlaçlama boyunca çalıştırmaya devam ediniz. Mekanik veya hidrolik karıştırıcıları kullanınız, hava karıştırıcısı kullanmayınız. Karışım içindeki tüm ürünler için etikette tanımlanan kısıtlamaları ve önlemleri dikkate alınız.

ALISTER 200 SC'yi sırt pompası, atomizör veya herhangi bir pülverizatör ile üstten uygulama şeklinde uygulamayınız.

ALISTER 200 SC hakkında bir şikayetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirin.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

ALISTER 200 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 28 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnc gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnc gelişimini geciktirmek için **ALISTER 200 SC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 28 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.



**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.**

ALISTER 200 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	28	Insektisit (Böcek İlacı)
-------	----	-----------------------------

200 g/L Cyantraniliprole

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FIRMA:

**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.**

Üretim Tesisi: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA

Merkez: Toplarönü Sok. No:16 Anadoluhisarı / İSTANBUL

Tel: (0216) 308 65 87 - 90 Fax: (0216) 308 65 84

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER
ve ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Topkarın Sokak No: 16 34510 Anadoluhisarı
Beşiktaş / İSTANBUL Yemkapı V.D.: 3020010P08
Merkez Tic. Sic. No: 48 - 8 Mersis No: 0802001500000011
Antalya Fab. Tic. Sic. No: 4244 44554 No: 330700100000015

Züral TÜRKMEN
Ruhsatlandırma Müdürü
Registration Manager



16 Ekim 2025

**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR**