

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 14.08.2023 / 12832

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Elma	Elma karalekesi (<i>Venturia inaequalis</i>)	65 ml/100 L su	28 gün
Kayısı	Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (<i>Monilinia laxa</i> = <i>Sclerotinia laxa</i>)	50 ml/100 L su	7 gün
Bağ *	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	100 ml/100 L su	7 gün
Domates (Sera)	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	100 ml/100 L su	3 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elma karalekesi:

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce) yapılır.
2. Uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler kısa saplarıyla ayrı ayrı görüldüğünde) yapılır.
3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 döküldüğünde yapılır.
4. ve Diğer Uygulamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Kayısıda çiçek monilyası:

1. Uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte) yapılır.
2. Uygulama: Tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır.

Bağda kurşuni küf:

Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde;

1. Uygulama: Tanelerin olgunluk başlangıcında,
2. ve Diğer Uygulamalar: Kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak (10-14 gün ara ile) yapılmalıdır. Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgelerinde;

1. Uygulama: Çiçeklenmeden hemen önce,
2. Uygulama: Kapalı salıkm döneminde,
3. ve Diğer Uygulamalar: Kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak (10-14 gün ara ile) yapılmalıdır. Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

Domates (Sera) kurşuni küf:

Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanmalıdır. Uygulamalar 10 gün ara ile yapılmalıdır.

CORKI 300 EC hakkında bir şikayetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.



**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.**

**CORKI 300 EC
Emülsiyon Konsantre (EC)**

Grubu	D1:9	Fungisit (Mantar İlacı)
300 g/l Cyprodinil		

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHRİLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.

Göz ile teması halinde: Yanma geçinceye kadar temiz su ile yıkanmalıdır.

Deri ile teması halinde: Su ve sabun ile yıkayıp uzun süre durulanmalıdır.

Kimyasal bulaşmış elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır.

Solunması halinde: Hastayı temiz havaya çıkarın ve sakın bir yerde tutun.

Yutulması halinde: Doktor çağırın. Bitki koruma ürününün ambalaj ve etiketini yanınızda götürün.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114



Net Miktarı:
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Cyprodinil, Calcium dodecylbenzene sulphonate, Xylene



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

- H315:** Cilt tahrişine yol açar.
 - H317:** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
 - H318:** Ciddi göz hasarına yol açar.
 - H319:** Ciddi göz tahrişine yol açar.
 - H226:** Alevlenir sıvı ve buhar.
 - H400:** Sucul ortamda çok toksiktir.
 - H410:** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
- ÖNLEM İFADELERİ:**
- P210:** Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez.
 - P261:** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyni solumaktan kaçının.
 - P280:** Korumacı eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
 - P501:** İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.
 - EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Anılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü kendi ambalajlarında kapalı olarak, kuru ve serin yerde saklayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR

SAN. VE TİC. A. Ş.

Üretim Tesisi: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA

Merkez: Toplarönü Sok. No: 16 Anadoluhisarı / İSTANBUL

Tel: (0216) 308 65 87 - 90 Fax: (0216) 308 65 84

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER

ve ZİRAİ İLAÇLAR SAHANI ve TİCARET A.Ş.

Toplarönü Sokakı No: 16 / 34090 Anadoluhisarı

Beykoz / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 308 65 87

Merkez Tic. Sic. No: 270018/000011 Mersis No: 0302001830800011

Antalya Etil. Sic. No: 0302001830800015 Mersis No: 0302001830800015

Mehmet Murat TURKMEENOĞLU

İş Geliştirme ve Teknik Tanıttımdan

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

22 Temmuz 2026

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

CORKI 300 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup D1:9 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için CORKI 300 EC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup D1:9 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

22 Temmuz 2026

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.

CORKI 300 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	D1:9	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	------	----------------------------

300 g/l Cyprodinil

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER
ve ZİRAİ İLAÇLAR SANATİ TİC. A.Ş.
Toplarönü Sokak No: 10000000000000000000
Beykoz / İSTANBUL / TÜRKİYE V.D.: 3470018008
Marka Tic. Sic. No: 10000000000000000000 Mersis No: 030700180000011
Antalya Etil. Tic. Sic. No: 10000000000000000000 Mersis No: 030700180000015
Menmet Murat TÜRKMEÑOĞLU
İş Geliştirme ve Teknik Tanıtımdan
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : E-81466379-320.04.02-25923495

28.07.2026

Konu : Tavsiye Ekleme - CORKİ 300 EC, DIREN
50 WP, DORYAT WG

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİNE
Toplaronü Sok. No:16 Beykoz / İSTANBUL

İlgi : a) 21.05.2026 tarihli yazınız.
b) 07.07.2026 tarihli yazınız.
c) 07.07.2026 tarihli yazınız.

Firmanız adına imal ruhsatı bulunan **CORKİ 300 EC, DIREN 50 WP ve DORYAT WG** isimli bitki koruma ürünlerine ait etiketlere ilgide kayıtlı yazılarda talep edilen tavsiyelerin ilave işlemi tamamlanmış olup Genel Müdürlüğümüz onaylı etiket örnekleri ekte gönderilmektedir. Bilgilerinizi rica ederim.

Bayram KERİMOĞLU
Bakan a.
Daire Başkanı V.

Ek:

- 1 - Etiket - CORKİ 300 EC (2 Sayfa)
- 2 - Etiket - CORKİ 300 EC (2 Sayfa) (Fiziksel Ek)
- 3 - Etiket - DIREN 50 WP (2 Sayfa)
- 4 - Etiket - DIREN 50 WP (2 Sayfa) (Fiziksel Ek)
- 5 - Etiket - DORYAT WG (2 Sayfa)
- 6 - Etiket - DORYAT WG (2 Sayfa) (Fiziksel Ek)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: A9F21DDC-E18A-470D-80EF-F9F5066D6599
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Meykİ 06800 Çankaya/ANKARA
KEP Adresi : tarimveormanbakankilgi@hs01.kep.tr

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Bilgi için:İsmihan DEMİRAY
AĞALAR
Mühendis
Telefon No:(312) 258 75 60

