

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarih ve Numarası:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Hıyar (Sera)	Kök-ur nematodları (<i>Meloidogyne spp.</i>)	200 ml/da dozda 4 uygulama	28 gün
Kornişon (Sera)	Kök-ur nematodları (<i>Meloidogyne spp.</i>)	200 ml/da dozda 4 uygulama	28 gün
Biber (Sera)	Kök-ur nematodları (<i>Meloidogyne spp.</i>)	200 ml/da dozda 4 uygulama	28 gün
Domates (Sera)	Kök-ur nematodları (<i>Meloidogyne spp.</i>)	200 ml/da dozda 4 uygulama (damlama sulama)	28 gün
		400 ml/da dozda 2 uygulama (damlama sulama)	28 gün

ROBIGO 20 SC, birçok nematod türüne karşı etkili güçlü bir nematod öldürücü bitki koruma ürünüdür. İçeriğinde bulunan abamectin, GABA (gamma-aminobutyrik asit) agonisti olup GABA'nın salınımını uyarak hedef zararlıların kas hücrelerinde GABA'nın bağlanmasını hızlandırır. Bu bağlanma sonucunda klorit iyonlarının akışında artış meydana gelerek sinir sistemi bloke olur. Abamectin toprakta kontakt etkilidir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Damla sulama uygulamalarında bitki koruma ürünü, sulama periyodunun ilk 1/3'lük devre ortasında verilmelidir. Kısa periyotta verilmeli, takiben kısa süreli su verilmelidir. Homojen bir dağılım ve yüksek etki sağlamak amacıyla ilk memeden son memeye kadar dolanması için bir süre beklenmelidir. Uygulama bittikten sonra son memede bitki koruma ürünü kalmamasına özen gösterilerek su verilmelidir. Kök bölgesine ulaşan bitki koruma ürünü nematod mücadelesini başlatır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Hıyar - Kornişon (Sera): Dikim esnasında karık içine veya can suyu şeklinde dikim yan yüzüne ya da damla sulama şeklinde toprağa uygulanır. Dikim sonrası can suyu şeklinde bitki dibine yapılacak uygulama ile en yüksek etki sağlanır. Birinci uygulamadan sonra 10-14 gün ara ile tekrarlanır. Damla sulamada her bitki sırasına bir hortum döşenmeli, her bitki yakınına bir meme düşmeli ve buradan homojen çıkış sağlanmalıdır.

Domates (Sera) ve Biber (Sera): Damla sulama şeklinde toprağa uygulanır. Birinci uygulamadan sonra 10-14 gün ara ile tekrarlanır. Domateste ya 200 ml/da dozda 4 uygulama ya da 400 ml/da dozda 2 uygulama yapılır. Damla sulamada her bitki sırasına bir hortum döşenmeli, her bitki yakınına bir meme düşmeli ve buradan homojen çıkış sağlanmalıdır.

ROBIGO 20 SC hakkında bir şikayetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.

ROBIGO 20 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	6	Nematisit (Nematod İlacı)
-------	---	------------------------------

20 g/L Abamectin

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünün uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA
KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.
Göz ile teması halinde: Yanma geçinceye kadar temiz su ile yıkanmalıdır.
Deri ile teması halinde: Su ve sabun ile yıkanıp uzun süre durulanmalıdır.
Kimyasal bulaşmış elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır.
Soluması halinde: Hasta temiz havaya çıkarılmalı ve sakın bir yerde tutulmalıdır.
Yutulması halinde: Doktor çağırın. Bitki koruma ürününün ambalaj ve etiketini yanınızda götürün.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

Net Miktarı:
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Abamectin



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H361d: Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
H400: Sucul ortamda çok toksiktir.
H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
ÖNLEM İFADELERİ:
P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
P273: Çevreye verilmesinden kaçınınız.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız.
- Bitki koruma ürününü kendi ambalajında, kapalı, serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.

DİKKAT: Kullanmadan önce iyice çalkalayınız!

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR

SAN. VE TİC. A. Ş.

Üretim Tesisi: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA

Merkez: Toprak Sok. No: 16 Anadoluhisarı / İSTANBUL

Tel: (0216) 308 65 87 - 90 **Fax:** (0216) 308 65 84

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER

VE ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Toprak Sokak No: 16 34810 Anadoluhisarı

Beykoz / İSTANBUL Tescilli V.D.: 3020018808

Merkez Tel. Sic. No: 68 - 8 Merkez No: 0307001880800011

Antalya Fab. Tel. Sic. No: 42447-44544 Merkez No: 0307001880800015



Zühal TÜRKMEN
Ruhsatlandırma Müdürü
Registration Manager

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

ROBİGO 20 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 6 olarak sınıflandırılmış bir nematisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **ROBİGO 20 SC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 6 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer ürünler ile karıştırılması tavsiye edilmez.



DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.

ROBİGO 20 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	6	Nematisit (Nematod İlacı)
-------	---	------------------------------

20 g/L Abamectin

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER
ve ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Toplantı Sokak No: 16 34810 Anadoluhisar
Beykoz / İSTANBUL Yenikapı V.D.: 3020018800
Merkez Tic. Sic. No: 68 - 8 Mersis No: 0302001880000011
Antalya Fab. Tic.Sic.No: 42447-44644 Mersis No: 070201188000015

Ziial DÜRKİMEN
Ruhsatlandırma Müdürü
Registration Manager



16 Temmuz 2025